



Con un 10% más de área, la región núcleo produciría casi la tercera parte del maíz argentino en el ciclo 2021/22


A nivel país se espera un crecimiento interanual en área de maíz de un 5%. Pero en la región núcleo ya se estima un 10% más de hectareaje. Sería la región que más crecería: aportaría 17 de los 54 Mt que se esperan de Argentina.

Bajas temperaturas y nevadas

Con mínimas por debajo de los valores estacionales, hubo lluvias muy débiles y nevadas en Córdoba.

"La perturbación en los niveles medios de la atmósfera sobre el Pacífico en su avance desde el oeste, además del abrupto descenso de las temperaturas, generó inesperadas precipitaciones sobre el NOA y oeste de Córdoba" comenta José Luis Aiello, Dr. en Cs. Atmosféricas.

La región núcleo será punta de lanza del nuevo ciclo maicero, sembraría un 10% más de área



Hace 15 días atrás se estimaba un aumento del 8% del área respecto a la del año pasado. Pero la alta demanda de insumos para el cereal continúa y ya se estima un

hectareaje mayor: pasaría de 1,61 M ha —que fueron relevadas por estudio satelital— a 1,79 M ha. Se trataría de la mayor siembra maicera de la región. Este incremento interanual de un 10%, restándole 70 mil ha (porque su producción no ingresaría al circuito comercial) y tomando un rinde promedio de 99,1 qq/ha, muestra un horizonte productivo de 17 Mt. O sea: la región núcleo, con un escenario climático que no fuese ni malo ni muy bueno, produciría casi la tercera parte del maíz argentino (un 31,5%). No hace mucho, entre el 2010 y el 2015 la región núcleo producía, en promedio, tan solo 7 Mt por año. El ciclo 2021/22 plantea un salto de 10 Mt más que en aquella época.

¿Dónde se sembrará más y menos maíz en la región núcleo?

En el sudeste cordobés se planea sembrar un 10% más de maíz, desplazando a la soja de primera: "con los rindes alcanzados de maíz este año nadie duda que el cereal presenta mejor productividad que la soja. La oleaginosa solo podría crecer si no hay suficiente semilla de maíz, sino va a ceder mucha área", explican. En el centro sur de Santa Fe el aumento del área de maíz varía entre 5 y 20%. En el norte bonaerense se espera una suba del 7%. Y el maíz tardío y el de segunda también tienen su importancia en esta avanzada maicera. En Pergamino comentan que habrá mucho más maíz tardío. Los lotes tardíos sembrados en el 2020 están siendo cosechados con muy buenos rindes, con un 10 a 20 % más de rindes respecto de los tempranos. "Los resultados son mucho mejores que los de sojas tardías", concluyen.

Alerta por insumos

El adelanto de las compras de insumos en esta precampaña está mostrando señales de faltantes y aumentos de precios en productos claves para la producción. "Se han agotado los materiales de semillas híbridas de mayor potencial", comentan los ingenieros de Bigand. En Carlos Pellegrini se consiguen semillas de

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas






maíz de bandas inferiores ya que **los materiales con mejores calibres se han agotado**. En cuanto a la fertilización, explican: **"hay inconvenientes en la producción de fertilizantes, y el precio sube. Los productores estén muy activos para asegurarse un precio y no quedarse sin producto"**. En Pergamino, expresan que **la fertilización no aumentaría "probablemente se mantenga el nivel del 2020; están muy caros"**. Hacia el oeste, en General Pinto, explican: **"están pasando muchas cosas que a esta precampaña la vuelven muy diferente. Antes, los insumos bajaban a la hora de la siembra. En cambio, ahora los insumos no van a bajar de acá en más. Ahora se siembra muchas más hectáreas de trigo y maíz. Aparte, el productor se anticipó, no hablamos solo de los grandes si no de los medianos y los chicos. También hay muchos problemas de producción. Y también de importación y todo pasa en medio de una pandemia. En conclusión, hay menos disponibilidad y los precios suben"**.

agua, la siembra se había detenido la semana pasada en casi toda la provincia. De las 1,4 M de ha que se esperaban implantar, **100 a 200 mil ha se daban casi por descartadas. Casi**. Habrá que ver en los próximos días que sucede finalmente, pero **este evento brinda una segunda oportunidad de siembra a numerosos lotes que hasta hace pocos días estaban sin posibilidades**.

Trigo 2021/22: ya se sembró el 85% en la región núcleo Con 1,44 M ha del trigo sembrado, el ciclo actual sigue siendo el más adelantado de las últimas 5 campañas. Las buenas condiciones de humedad en la mayor parte de la región núcleo permitieron que esta semana se sembraran **420 mil ha** con trigo. En el centro sur y sur santafesino **restan muy pocos lotes para dar por finalizada la siembra**. El sudeste cordobés lleva un avance del **90%**. El noreste bonaerense va atrás, y por lejos, pero con la ventaja de muy buenas reservas de agua en el suelo. Allí, **queda un 35% del trigo por sembrar**.

Lluvias y nieve en Córdoba: un evento que puede ser clave para que se siembren 100 a 200 mil ha de trigo



No solo fue atípica la nevada en Córdoba, también fue muy infrecuente la cantidad de milímetros que entre lloviznas y nieve recibió la provincia. **En sólo dos días, Córdoba recibió los acumulados de todo el mes de junio**. El centro y buena parte del oeste registraron **10 a 20 mm** del 15 al 17 de junio, casi el doble de los 5 a 8 mm que suele recibir en todo el


mes. Y este evento ha sido sumamente oportuno ya que puede ser clave para la siembra triguera. **Por falta de**

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas






Semana al 17 de junio de 2021 - N° 715 - AÑO XII - INFORME SEMANAL ZONA NUCLEO



LLUVIAS DIARIAS A NIVEL NACIONAL



GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas:



**DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS**


Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR



SUBZONAS Y RED DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS GEA



SUBZONA I

"Se ve muy buen nacimiento de trigo. Las reservas de humedad acompañan este año", comentan en El Trébol sus técnicos. Pero falta en superficie, hasta el martes 15 se señalaba que hay lotes con la siembra frenada por falta de agua. "Es muy probable que se los deje de lado a menos que llueva algo en estos días", explican. ¿La fertilización será mayor a la del año pasado? Sí, se ha trabajado para apuntar a obtener 40 qq/ha, responden. Se estima entre un 10 y un 20% de crecimiento de área para el cultivo de maíz en el nuevo ciclo. No se espera sumar más planteos con mediana y alta tecnología: "se lo hará con los mismos niveles que el año pasado". "Por ahora, no hay serios inconvenientes para conseguir suficiente semilla, señalan

En Carlos Pellegrini se estima un aumento de área de maíz temprano de un 5 a 10%, respecto al año anterior. La demanda del cereal es sostenida. "Por ahora la semilla se está consiguiendo en bandas inferiores ya

que los materiales con mejores calibres se han agotado", indican los ingenieros. En cuanto a la fertilización, "los inconvenientes en la producción de fertilizantes y el consecuente incremento en precios generan que los productores estén tomando posición, de modo de asegurarse el precio y no quedarse sin producto". Y agregan: "tienen incorporado que usar materiales de alto potencial sin fertilización, no rinde", agregan los técnicos. El 90% del trigo estimado ya fue sembrado sin problemas de humedad; esta semana se concluirá con el resto. Se realizó la fertilización de arranque con fertilizantes; "fueron adquiridos antes de los aumentos de precios", explican. El 80% de los productores aplicó el nitrógeno necesario para todo el cultivo de manera anticipada y pueda ser utilizado desde temprano y no tener que intervenir con el cultivo ya emergido. Los profesionales señalan que "puede haber algún arriesgado que piense en hacer algún agregado extra a lo aplicado, si todo va excelente". Los maíces tardíos 20/21 dan sorpresas: la cosecha muestra rindes que rondan los 100 qq/ha. Han tenido humedad durante todo el ciclo. Los pocos lotes sembrados se están cosechando en estos días con humedad cercana de las de recibo.

"Vamos a aumentar un 15% la superficie del próximo maíz en reemplazo de la soja de primera", indican los ingenieros de Cañada Rosquín. A su vez, se incrementarán las dosis de fertilizantes para compensar el deterioro de los suelos, "pero no mucho más, debido al alza de precios de los fertilizantes", advierten. Finalizó la siembra de trigo. En el centro-norte de Córdoba, hasta el lunes manifestaban que por la baja humedad edáfica no se pudo avanzar con la implantación. Pero entre miércoles y jueves hubo milímetros que pueden ser claves para que la campaña no cierre allí con pocas hectáreas de trigo sembradas. El nivel de fertilización se mantendrá respecto al del año pasado. Este fin de semana comenzará la cosecha de los maíces tardíos y de segunda. Los lotes más secos poseen una

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea



humedad del 16%. **Se observan muchas plantas caídas, según el lote y el híbrido usado.**

Se proyecta un aumento de 10% del área de maíz total en la zona Villa Eloísa y Cañada de Gómez. "Este año el maíz tardío está rindiendo bien, comparando con soja tardía, la supera ampliamente en rendimiento y ganancias", analizan los técnicos. También se suma que en las dos últimas campañas la soja tardía no alcanzó resultados satisfactorios. **Todo inclina la balanza hacia el maíz tardío y/o de segunda: el cambio de área 2021/22 quedaría con una suba de un 5% para el maíz de primera y un 15% para el tardío. El trigo sufriría un retroceso del 10% del área, así como también la soja de primera (-5%) y la de segunda (-15%).** "El paquete tecnológico depende del perfil del productor. **Pero en la zona los planteos son de media a alta tecnología,**" aclaran. **"Si el año viene bien en términos climáticos y medidas comerciales, los planteos tienden a ser de alta tecnología, como consecuencia del incremento en la fertilización",** agregan. Por el momento no notan escasez de semillas híbridas. **El trigo está por finalizar su siembra con un 95% del área cubierta.** En la zona siembran hasta el 20 de junio. **"El nivel de fertilización es igual o menor que el año pasado debido a la incertidumbre climática. Se apunta a rindes de 35 a 40 qq/ha". La cosecha del maíz tardío alcanza el 40% del área arrojando rindes por encima de lo esperado: 90 qq/ha.** La humedad del grano es de 16 a 17%: se incurre en gasto de secada para evitar el vuelco de la planta en el lote.

SUBZONA II

¿Qué se espera de la superficie de maíz 20/21? "En **Bigand, el área de maíz se va a mantener o podría aumentar hasta un 5%**", mencionan los ingenieros. En cuanto a la tecnología, "se busca en mayor medida los híbridos más completos con varios eventos". **¿Falta semilla?** Los técnicos responden: **"semilla híbrida hay disponible en el mercado, pero se han agotado los materiales**

considerados de mayor potencial". La posibilidad de incrementar las dosis de nitrógeno es una decisión que se toma cerca de la siembra del maíz. En relación a fósforo y azufre, generalmente se aplican buenas dosis. El uso de zinc no es muy frecuente, explican en el área. En cuanto al **avance de siembra de trigo, se está superando el 90% de lo intencionado. La superficie se mantuvo respecto al año pasado.** La mayoría sembró variedades de ciclo intermedio-largo o intermedios. Las condiciones de humedad del suelo son muy buenas. **La fertilización a nivel general, no cambia demasiado en relación a la campaña pasada. Se apunta a superar los 40 qq/ha.** Respecto a los pocos lotes sembrados con maíz de segunda, se está a la espera de que baje la humedad de los granos. **Solo se cosechó un lote con 21°H y se logró un promedio de 75 qq/ha neto.**

En **Bombal** se proyecta **mantener o incrementar levemente el área con maíz temprano.** "Por el momento se está consiguiendo semillas, pero **hay dudas en los niveles de fertilización por el aumento del precio,**" señalan los ingenieros. **Falta muy poco para terminar la siembra de trigo.** Si bien **existe incertidumbre en los niveles de fertilización por el incremento en el precio, se estima que será muy similar a la del año pasado.** En cuanto a la cosecha del maíz tardío 20/21, se está esperando a que el grano baje la humedad, ya que está en un 18%.

SUBZONA III

"Hay una tendencia a incrementar levemente el área maicera 2021, que fue muy importante. Probablemente, habrá mucho maíz tardío: un 7% más", comentan los técnicos de **Pergamino.** Los lotes tardíos sembrados en el 2020 están siendo cosechados con muy buenos rindes, y alienta a sumarlos en el nuevo ciclo. **Y todo esto podría restarle un 5% a la próxima siembra de soja de primera.** Al preguntarles por niveles de fertilización para maíz 2021/22 resumen, **"probablemente se mantenga el nivel del 2020; están muy caros.** Acerca

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea



de la disponibilidad de semillas, "con la experiencia que tuvimos en las últimas campañas, la semilla no debería faltar", explican. La siembra triguera avanza a paso firme: **"hay abundante humedad en los suelos y muy buen tiempo**. En los alrededores de Pergamino - Colón no falta el agua. **La fertilización del trigo también se resentirán por los ajustes: "la fertilización será buena pero ajustada a las recomendaciones, ya que su precio ha aumentado mucho"**. En cuanto a la cosecha de los maíces tardíos, se están trillando los maíces sembrados a finales de noviembre, **"secos y con muy buen rendimiento: incluso con un 10 a 20 % más de rindes respecto de los tempranos"**. Los maíces de segunda, los sembrados después del trigo, "van a bajar algo su productividad, pero también generan buenas expectativas", señalan en el área.

SUBZONA IV

"Hay faltante de híbridos de maíz, y eso que acá no vemos un aumento importante de área", comentan los técnicos de **General Pinto**. "Los fertilizantes ya subieron pero siguen escalando. Los agroquímicos también. **Están pasando muchas cosas que a esta precampaña la vuelven muy diferente. Antes, los insumos bajaban a la hora de la siembra, había sobreoferta, muchos costos por almacenamiento y también por la financiación que requiere todo. En cambio, hoy los insumos no van a bajar de acá en más**. Ahora se siembra muchas hectáreas más de trigo y maíz. Aparte, el productor se anticipó, no hablamos de los grandes si no de los medianos y los chicos. También hay muchos problemas de producción. También de importación y todo pasa en medio de una pandemia. En conclusión, hay menos disponibilidad y los precios suben", comentan los ingenieros de la zona. En cuanto al trigo, la siembra ya avanzó entre un 60 y 70%. Sin problemas de falta de agua, se va trabajando sin problemas. "De todos modos, no vemos un gran cambio de hectareaje respecto al 2020. Sí vemos algunos lotes de cebada que se van a sumar este año", explican en el área.

SUBZONA V

En Monte Maíz se espera un incremento del área maicera 2021/22 respecto a la campaña pasada y desplaza soja de primera. **"Siempre y cuando haya abastecimiento de semilla. Hay mucha incertidumbre...los proveedores tienen cerrados los negocios pero no tienen en claro la entrega de la mercadería"**, comentan los técnicos de la zona. En la zona se buscan rotaciones de **40% de trigo, 40% de maíz y 20% de soja de primera**. **"Con los rindes alcanzados de maíz este año nadie duda que el cereal presenta mejor productividad que la soja. La oleaginosa solo crecería si no hay suficiente semilla de maíz, pero sino va a ceder mucha área a las gramíneas"**, comentan. Y explican: **"los productores de la zona están entendiendo cada vez más la interacción genotipo-ambiente. Por eso van incrementando las densidades y el nitrógeno. Esta es una de las razones por lo la provincia de Córdoba explotó con el maíz este año"**, destacan. **Respecto a la siembra de trigo, hay muy buena humedad para terminar con la siembra planeada. El avance llega al 90% del área. "Sin embargo, no hay muchas variedades de semilla por la crisis productiva de la campaña pasada. Si bien la genética no sería la mejor, el productor está fertilizando muy bien, incorporó al suelo todo el fertilizante con humedad óptima. Se apunta a 50 qq/ha"**, detallan. Se espera un incremento de trigo sobre rastros de maíz por los buenos resultados obtenidos la campaña previa. **La cosecha de maíz tardío avanza con buenas productividades: 80 a 135 qq/ha; el promedio está en 110 qq/ha. Los más afectados por granizo bajaron 70 quintales**. Los maíces sembrados a mediados de diciembre y los de segunda les falta perder humedad. Segunda.

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea



INDICADORES CLIMÁTICOS

Lo que viene, el pronóstico para la semana próxima en la **región núcleo**

Frío y heladas hasta el domingo

Habrà heladas generalizadas hasta el fin de semana. A partir del lunes, se espera el ascenso térmico. Pero será muy progresivo: el frío y a humedad seguirán y pueden generar condiciones inestables.

A partir del lunes el ascenso térmico será progresivo y los valores que se irán alejando del riesgo de heladas. El mismo comportamiento se observará con las temperaturas máximas, ya que lentamente los registros irán aumentando con el avance del período de pronóstico. Los valores previstos serán acordes con la época del año.

No se esperan precipitaciones de consideración durante los próximos siete días. **Aun así debemos mencionar que, con las bajas temperaturas y la humedad presente se pueden generar condiciones de tiempo inestable**, pero las precipitaciones que podrían estar asociadas a este escenario serían prácticamente nulas en la región.

La **cobertura nubosa** será abundante, especialmente la primera mitad del periodo que todavía presentará condiciones de alta humedad favorables para que el cielo se mantenga mayormente cubierto. A partir del lunes se podrá observar una disminución de la nubosidad en toda la zona GEA.

La **circulación del viento** también hará su aporte para el ascenso térmico ya que inicialmente prevalecerá del sector sur pero a partir del fin de semana se espera que rote al sector norte fomentando el incremento de las marcas térmicas.

Por último se destaca que la **humedad en las capas bajas de la atmósfera** seguirá siendo muy importante en la primera parte de la semana. Las bajas temperaturas y el alto contenido de humedad atmosférica pueden generar

condiciones de inestabilidad, aunque no suficientes como para provocar precipitaciones en la región.

Lo que pasó con el clima en la última semana en la **región núcleo**

Bajas temperaturas y nevadas

Con mínimas por debajo de los valores estacionales, hubo lluvias muy débiles y nevadas en Córdoba.

Las principales precipitaciones se desarrollaron en la jornada de ayer, con la presencia de **nevadas en algunos sectores de la provincia de Córdoba**. El resto de la región no presentó precipitaciones a lo largo de todo el periodo de análisis.


Las **marcas térmicas máximas** se mantuvieron en valores inferiores a los de la semana pasada, con registros dentro de los niveles medios para la época del año, que se mantuvieron entre **22 y 25°C**. El dato más destacado se midió en la localidad de **Colonia Almada, Córdoba**, con un registro de **26,2°C**. Las **mínimas** se ubicaron en valores levemente inferiores a los normales estacionales, e inferiores a los observados el periodo previo, con marcas entre **1°C bajo cero y 1°C**. El valor más bajo fue en **Gral. Villegas, Buenos Aires**, con **1,4°C bajo cero**.

Se puede observar que las **reservas de humedad en el suelo** muestran una situación similar a la semana pasada, con un leve detrimento, producto de la ausencia de lluvias, pero con buenas características hídricas en toda la región. Sólo una pequeña porción sobre el **extremo noroeste de GEA** se mantiene, igual que las semanas previas, con **condiciones de humedad regular**. **El resto de la región presenta características entre adecuadas y óptimas.**

Para los próximos quince días no se necesitan lluvias de magnitud para mantener los buenos niveles de humedad en toda la región GEA. Sólo se deberían recibir **entre 5 y 10 milímetros** para alcanzar niveles óptimos en la mayor parte de la zona, mientras que **sobre el noroeste de GEA** serían necesarios entre **20 y 40 mm** para lograr condiciones hídricas adecuadas.

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas





Extensión GEA: O de Córdoba, N de Santa Fe, Santiago del E. y Chaco

El otoño finaliza con lluvias en el oeste y muy frío

La primera quincena de junio concluyó con el único aporte pluvial que le brindaron las escasas y dispares lluvias con las que comenzó el mes. El resto de los días transcurrieron con preponderancia de tiempo fresco y estable, aunque muy benigno y más propio de primavera que de finales del otoño. Por el contrario la segunda mitad del mes está siendo recibida con una importante circulación de aire muy frío, favorecida por una dinámica atmosférica que le permitirá sostenerse en el corto plazo anticipando la inminente llegada del invierno.

La presencia de un importante sistema de baja presión sobre el océano Pacífico está potenciando la intensa circulación de aire muy frío desde el sur argentino, brindándole al mismo tiempo la persistencia suficiente para provocar un marcado enfriamiento. Estas condiciones están llevando los registros térmicos de la última semana del otoño a valores muy cercanos a los típicos del invierno.

La perturbación en los niveles medios de la atmósfera sobre el Pacífico en su avance desde el oeste, además de provocar un abrupto descenso de las temperaturas, generó el desarrollo de inesperadas precipitaciones en forma de chaparrones aislados sobre el NOA y el oeste de Córdoba.

Los eventos excluyeron por completo la franja este del país, siguiendo de manera coherente la distribución diferencial este / oeste típica del semestre frío.

Por otro lado la intensa circulación de este aire cuasi polar causó abundantes nevadas sobre varias de las provincias mediterráneas, incluyendo a Córdoba donde la nieve tuvo una intensidad que no se registraba en catorce años.

Las lluvias acumuladas en las últimas veinticuatro horas han sido muy moderadas y dispersas, pero suficientes para acercar los registros mensuales a los valores medios de junio, especialmente sobre el oeste cordobés, confirmando la proyección de un semestre frío con una provisión de agua dentro de la normal histórica de la región pampeana.

Más allá del impacto que ha tenido sobre las temperaturas mínimas el abrupto cambio de las condiciones climáticas, la escasa demanda atmosférica ha sido muy favorable para mantener el adecuado nivel de las reservas de humedad permitiendo, al mismo tiempo, el avance de las tareas de siembra.

Superadas las precipitaciones derivadas del ingreso del frente frío, **los pronósticos de corto plazo no indican la ocurrencia de lluvias en la región central durante los próximos siete días. Sí la continuidad de un ambiente frío y seco con la presencia de heladas de variada intensidad en la transición otoño - invierno.**

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas






BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 17 de junio de 2021 - N° 715 - AÑO XII - INFORME SEMANAL ZONA NUCLEO



GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR