BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 16 de marzo del 2023 – N° 806 - AÑO XIV - INFORME SEMANAL ZONA NUCLEO

Soja en región núcleo: 2 millones de toneladas menos por calor y sequía

Se estima que en 15 días, la producción habría caído de 6,5 a 4,5 Mt. El rinde promedio de la región se calcula en 15 qq/ha, versus los 40 qq/ha que se anticipaban inicialmente. La ola de calor y la falta de lluvias sumaron superficie perdida, además de caída de productividad.

Inestabilidad para el sur y el oeste de la región

El viernes un frente favorecerá el sur de la región núcleo. A partir del lunes se esperan precipitaciones aisladas e intermitentes que beneficiarán a la franja oeste.

"El bloqueo comienza a desplazarse hacia el este. Esto provocará un cambio de masa de aire, un descenso generalizado de las temperaturas y el desarrollo de lluvias y tormentas en el centro del país", dice el consulto Elorriaga.

Con el nuevo recorte para la soja de la región, se cosecharía menos de la cuarta parte de lo que se esperaba producir



En la región núcleo, la campaña comenzó esperando producir **19,7 Mt de soja** (escenario normal de clima). Pero sin lluvias que pongan un piso, **los recortes productivos continuaron**. Recapitulando, el 9 de febrero la estimación bajó a 10,4 Mt; el 2 de marzo, a 6,5 Mt; y a este 16 de marzo **se reajustó a 4,5 Mt**. Lamentablemente, se repite la advertencia de 2 semanas atrás respecto de que la situación todavía puede empeorar. Por el momento, se estima que la cosecha solo **será el 23% de lo que se esperaba a principios del ciclo. Respecto al año pasado**, que se consideraba la peor campaña desde 2008/09 con 13,5 Mt, el ciclo **2022/23 podría dejar el 70% de ese volumen de soja.**

Números rojos para la soja 2022/23: un tercio de la superficie podría perderse y rinde promedio de 15 qq/ha

El rango del área sembrada con **soja de segunda** que se considera perdida por los encuestados oscila ampliamente, entre un **35% a 100%.** En 15 días, la falta de agua y las altas temperaturas permiten estimar un descuento adicional de 600.000 hectáreas de soja que podrían no cosecharse en la región núcleo. También es notable el deterioro en **soja de primera**. "… sin lluvias y con altas temperaturas, terminamos poniendo vacas en lotes de soja que estaban para la foto 20 días atrás", dicen en Piedritas. Allí consideran 25% de la soja de primera perdida.

Siguen en carrera 3 millones de hectáreas, pero en donde el rendimiento aun no encontraba piso. El promedio de toda la región pasó de 18 a 15 qq/ha. Esto es un 63% menos del rinde medio regional.



En la mayor parte de la región coinciden que es muy difícil estimar a campo el rinde: "se ven chauchas pero hay gran cantidad de granos abortados y granos con bajo peso". **Para la soja de primera el rinde estimado está en un rango que va de 10 a 25 qq/ha y para la de segunda en uno que va de 5 a 15 qq/ha.**

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
BCR

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR

BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO

GEA
Guía Estratégica para el Agro

Semana al 16 de marzo del 2023 – N° 806 - AÑO XIV - INFORME SEMANAL ZONA NUCLEO

Los primeros rindes y la calidad desilusionan a medida que avanzan las cosechadoras de soja

En Corral de Bustos —sudeste cordobés— ya se están levantando los primeros lotes: **los rindes rondan los 10 a 15 qq/ha.** Son lotes de soja de primera que se arrebataron por las altas temperaturas de las últimas semanas. **"Se cocinaron.** Son grupos cortos. Venían bien hasta esta última ola de calor. **La calidad está siendo muy mala: muchas vainas vanas, granos chuzos, granos verdes, arrugados**". Hay una gran preocupación por el descuento comercial que habrá, lo cual también **es otro factor que incide a la hora de evaluar si vale la pena cosechar o no.**

Cosechar o no cosechar: ¿cuál es límite cuando el rinde esperado es muy bajo?

Desde **Bragado** y **Alberti** alertan que gran parte de la soja de segunda está fisiológicamente en su definición botánica de planta muerta: "**no hay rendimiento, ni descendencia**". En soja de primera, hay preocupación por el **rinde final** que se obtenga en la cosechadora y el **valor final que tenga la mercadería** tras los graves problemas de calidad que se prevén. Por eso, **lotes con rindes de menos de 5 qq/ha y problemas de calidad no se cosecharían**. Desde **Cañada de Gómez** dicen: "**los productores que tengan el gasoil comprado y maquinarias propias cosecharán hasta sojas de 3 qq/ha.** Pero en el caso **de arrendatarios que tengan que contratar la labor, no levantarían esos lotes".**

¿La sequía de los últimos 45 días fue culpa de "La Niña"?

Finaliza la mitad de marzo con **ola de calor inédita y lluvias escasas sobre la región**. El consultor **Elorriaga** explica que la causa de este hecho fue la persistencia de **un bloqueo atmosférico, asociado a la posición del anticiclón del Atlántico sobre el área central del país**. "**Este intenso centro de alta presión situado frente a la costa este de Argentina impidió durante los últimos 45 días el ingreso de los sistemas frontales hacia el centro del país**. **"El resultado fue una virtual barrera de circulación que dificultó el avance de lluvias y tormentas más allá del centro bonaerense, La Pampa y la franja oeste de la región pampeana llegando hasta el norte del país. Es decir, una campana invisible que mantuvo ausentes las lluvias sobre el sudeste de Córdoba, centro-sur de Santa Fe, Entre Ríos y norte de Buenos Aires".**



Elaborado con datos propios y publicos del SMN

La otra variable que se acopló a la falta de agua y le dio la estocada final a los cultivos, fue la persistencia de

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
BCR

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

temperaturas extremas que no cesaron desde finales de febrero. **No hay registros en los últimos 100 años de una ola de calor tan larga en el tiempo - 18 días consecutivos- y con temperaturas mínimas y máximas tan elevadas.** "Lo llamativo fue que las temperaturas mínimas durante este período presentaron el mismo nivel que las temperaturas máximas medias de marzo, y las temperaturas máximas estuvieron 10°C por encima de la temperatura máxima promedio para el mes. Según Elorriaga, **"la buena noticia es que los pronósticos indican que a partir de la segunda quincena, el bloqueo comienza a desplazarse hacia el este** y la circulación de los sistemas frontales aumenta su incursión hacia el centro del país. **Esto provocará un cambio de masa de aire, un descenso generalizado de las temperaturas y el desarrollo de lluvias y tormentas que, aunque todavía erráticas y dispares, aumentarán su área de cobertura hacia el centro del país".**

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas
Galicia · La Segunda · San Cristóbal Seguros · Grupo Sancor Seguros

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
BCR

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.
FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR





GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas

Galicia · La Segunda · San Cristóbal Seguros · Grupo Sancor Seguros

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
BCR

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 16 de marzo del 2023 – N° 806 - AÑO XIV - AÑO XIV - INFORME SEMANAL ZONA NUCLEO

SUBZONAS Y RED DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS GEA



SUBZONA I

Desde el día sábado 11, comenzaron a **cosecharse los primeros lotes de maíz temprano** en **Carlos Pellegrini**. El **95 %** de los lotes presentaron rindes de **30 a 50 qq/ha**. Hubo un 5% que corresponde al sur de la localidad en el que se han obtenido resultados cercanos a los **80 qq/ha** en **cuadros puntuales**. Los lotes de soja de primera aún no están listos para la cosecha, "recién ahora se están entregando, es decir, perdiendo hojas. A la vista queda **un triste panorama de chauchas que no han podido llegar a llenar el grano formado**", comentan. Se calcula un rendimiento promedio de **20 qq/ha** y un **15% del área perdida**. Para la soja de **segunda**, el promedio se estima en **5 qq/ha** con un **35% de la superficie perdida**. **En maíz de segunda, el 40% se perdió y el rinde se proyecta en 30 qq/ha.**

Soja 2° (al 15/03/2023)

Maíz 2° (al 15/03/2023)

Gentileza José Luis Sgreccia

En **El Trébol** el rendimiento de la soja de primera está casi definido. Los ingenieros clasifican a la actual campaña como buena a muy buena teniendo en cuenta las condiciones extremas que han soportado los cuadros de la oleaginosa. Se espera un rinde de **30 a 40 qq/ha**. No hubo reporte de pérdida de lotes. Por el contrario, **el 90% de la soja de segunda se considera perdida.** De los lotes que continúan en pie, se estima un rinde de **15 qq/ha**. **En cuanto al maíz tardío, se calcula un resultado de 30 qq/ha**.

"**La situación es caótica. Si lloviera bien, podríamos empezar a pensar en un piso de rindes**", comentan con gran preocupación los ingenieros de los alrededores de **Rosario**. Mientras no ocurra un buena lluvia con éstas temperaturas, **día a día caen los rindes**", agregan. En unos 9 días comienza la cosecha de soja. Se estima un rinde promedio de **23 qq/ha, no hay lotes perdidos por la zona.** Por el contrario, **la soja de segunda, sí se considera totalmente perdida.** Los técnicos hacen la excepción de los lotes del sudeste Córdoba con una expectativa de 20 qq/ha. En cuanto al maíz temprano, se calcula un rinde medio de **25 qq/ha**. "Hay vecinos que cosecharon de **1 a 50 qq/ha**", indican los técnicos. "En el maíz tardío, la expectativa de rinde es de **60 qq/ha** si llueve bien; de lo

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
BCR

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR

contrario seguiremos esperando un piso más bajo", advierten.

SUBZONA II

Desde **Bombal** ya no le quedan comentarios para describir lo dramática de la situación: "si una semana atrás estaba todo mal, hoy estamos peor. La situación es terminal para la generalidad de los lotes".

SUBZONA III

Los ingenieros de San Pedro comentan que hubo algunas lluvias aisladas en esta semana: "acá, puntualmente llovió, (pero hacia Arrecifes o Baradero no). Medimos **24 mm** en la planta. **Fue algo muy fuerte, muy rápido y muy puntual, a 30 o 40 km no pasó nada**. Son tormentas que pasan y al que le toca, le toca". En soja de primera, "en buenos lotes y bien trabajados siguen en carrera", explican. Pero, estiman 10 o 15 qq/ha. Y aclaran: "está siendo **casi incomprobable tener una idea acertada de rinde**. Hay chauchas con un grano, dos…" A pesar de algunos alivios muy acotados, explica que gran parte del maíz tardío y sojas de segunda se secó: "**hay lotes secos enteros**; los últimos 10 días de calor han sido demasiado. En el área estiman que sería **más de una tercera parte de lo sembrado lo que ya se da por perdido**. "Será importante el **cambio de clima, (menores temperaturas y lluvias) para los maíces tardíos que están floreciendo o lo estén haciendo en los próximos días"**.

SUBZONA IV

"**Febrero destruyó los cultivos**. Venia todo muy lindo hasta después de la primera ola de calor y la helada temprana", dicen desde **General Villegas y Piedritas**. "**sin lluvias y con altas temperaturas, terminamos poniendo vacas en lotes de soja que estaban para la foto 20 días atrás**". En el área, el **25% de la soja de primera está perdida, otro 25% está en malas condiciones y esperan 15 qq/ha**. El **50% restante** está de bueno a muy bueno y esperan un rinde de entre **25 a 35 qq/ha**. En cuanto a la **soja de segunda, el 50% se perdió** y en el otro 50% se esperan entre **10 a 15 qq/ha**. "**Hace 20 días que ya no pulverizamos y casi que no recorremos las sojas de segunda**". Los técnicos explican que determinar el rinde se les hace **muy difícil debido a la heterogeneidad en el impacto** del clima y a la calidad de lotes. Hay diferencia muy marcadas hasta dentro de un mismo lote. "Por ejemplo, **hay lotes donde la mitad de la superficie esta lista para cosechar.** Podemos esperar allí, unos 18 qq/ha porque se arrebató por las altas temperaturas. **Pero hay otra parte que recién está entrando en madurez fisiológica y podríamos obtener unos 30 qq/ha**". Por otro lado comenzó la cosecha de los pocos maíces tempranos que hay en la zona y para sorpresa los rindes están entre los **70 qq/ha a los 100 qq/ha**. **Pero en los tardíos las expectativas de rinde cayeron, hay un 25 % en mal estado un 15% perdido**. El resto se reparte entre bueno y muy bueno.

SUBZONA V

"A la fecha todo lo de primera está absolutamente definido y el 80 % de lo tardío también. **Estimamos pérdidas productivas de al menos del 50 % en maíz de 1º y en Soja de 1º**. De ocurrir lluvias en estos días pueden llegar a frenar las pérdidas en aquellos planteos de lotes tardíos. Pero para muchos lotes de **maíz y soja de 2º donde ya llegarían tarde**", lo dicen desde **Marcos Juárez** y agregan lo que cuentan, sería en un escenario optimista: " bajo un contexto de lluvias durante esta semana". Esto haría posible alcanzar **25 qq/ha** de rinde para soja de primera y **8 qq/ha para soja de segunda**. **De lo contrario, van a haber lotes de soja y maiz que no valga la pena cosechar**. "**En 34 años de experiencia como profesional en la zona nunca vi algo parecido. Esto es mucho peor que la campaña 2008/09 y la 2017/18**". En cuanto a los primeros lotes cosechados de maíz temprano (15% de avance), los rindes que se están obteniendo son muy

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas Galicia La Segunda San Cristóbal Seguros Grupo Sancor Seguros

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.
FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR

variables, van de los **10 qq/ha a los 100 qq/ha** pero el promedio está en los **55 qq/ha**.

"Comenzamos a cosechar los primeros lotes de soja de primera. Son grupos cortos. **Venían bien hasta que esta última ola de calor los arrebató**. **La calidad está siendo muy mala: muchas vainas vanas, granos chuzos, granos verdes, arrugados**. Los rindes andan entre **10 a 15 qq/ha.** Estos lotes se **cocinaron. Así como suena: literral**", dicen desde **Corral de Bustos.** Agregan que "**no queda lote verde de soja de segunda, el 80% se perdió y en el resto esperan solo 5 qq/ha**". En cuanto a la cosecha de maíz temprano, está arrojando rendimientos que van desde los **30 qq/ha a los 80 qq/ha**, y hay casos puntuales de 90 qq/ha. "¡El calor es tal, que en una semana la humedad a cosecha bajó 5 puntos! Los rindes van a depender de si el lote agarro un chaparrón o no, ya que las lluvias fueron muy desparejas".

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas Galicia La segunda San Cristóbal Seguros Grupo Sancor Seguros

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS BCR

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR

BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 16 de marzo del 2023 – N° 806 - AÑO XIV - AÑO XIV - INFORME SEMANAL ZONA NUCLEO

INDICADORES CLIMÁTICOS

Lo que viene, el pronóstico para la semana próxima en la región núcleo

Lluvias hasta el martes

El viernes se podrían dar las mayores probabilidades de chaparrones en el centro y sur del área GEA. Se espera que las lluvias y tormentas persistan hasta el día martes.

La región GEA comenzará afectada por la presencia de un sistema frontal estacionario ubicado en el norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Entre Ríos y de Santa Fe. **Este sistema podría provocar chaparrones aislados e intermitentes dentro de la zona con una probabilidad que aumente a partir la tarde/noche del viernes 17, principalmente en el centro y sur del área GEA**.

Se espera que las lluvias y tormentas persistan hasta el día martes cuando, el avance de una nueva perturbación, irá desplazando la inestabilidad hacia el norte provocando que mejoren las condiciones meteorológicas.

Las temperaturas seguirán siendo elevadas hasta el viernes 17, con valores máximos que podrían oscilar entre 32 y 36°C. **Los registros térmicos se presentaran en disminución a partir del sábado**, con un descenso más importante en el sector sur del área GEA y menos significativo en el norte. En el sur los valores máximos oscilarán entre los 19 y los 22°C, mientras que en el norte variaran de 28 a 30°C. **El lunes 20 de marzo los valores térmicos comenzarán a ascender nuevamente,** pero con mínimas que se mantendrán en torno a los 18°C. **A partir del martes las temperaturas tienden a descender en forma generalizada dentro de la zona GEA, con valores mínimos cercanos a los 10°C en el sector sur y de 12 a 14°C en el resto del área**.

Lo que pasó con el clima en la última semana en la región núcleo

Chaparrones aislados e intermitentes en gran parte del área GEA

Los valores semanales variaron entre los 10 y 50 mm. El máximo, 98 mm, fue registrado en Colonia Almada. Le sigue Bengolea con 50 mm (ambas en Córdoba).

Los acumulados más significativos se localizaron en el oeste, principalmente en Córdoba y centro/oeste de Buenos Aires con presencia de tormentas, algunas de las cuales fueron localmente intensas.

Las **temperaturas** fueron muy elevadas y generalizadas para esta época del año, con máximas que superaron, en toda la región, los **39°C**, y valores máximos extremos puntuales en Santa Fe, norte de Buenos Aires y este Córdoba. El valor más elevado se registró en localidad de **Pozo del Molle**, donde se midieron **40.8°C**, seguido por **Rojas** y **Monte de Oca** con un registro compartido de **40.7°C**. Las mínimas oscilaron entre **17 y 20°C** en gran parte de la zona GEA. El valor mínimo extremo, **15°C**, se midió en **Chacabuco** y en segundo lugar, en **Lincoln**, se registraron **15.3°C**.

Con este panorama y gracias a los montos de precipitación recibidos durante los últimos siete días, se produjo una recarga significativa en el **oeste de la región GEA**, que mejoró la humedad del suelo a la categoría de **adecuada o regular**. En el **resto de la región** todavía persisten las condiciones de **escasez o sequía**.

Debido a estas condiciones de humedad edáfica, en **Santa Fe, Buenos Aires y este de Córdoba** se requiere que, en los próximos quince días, los acumulados de precipitaciones superen los **120 a 160 mm** para alcanzar el estado óptimo de las reservas de agua (**en el 1era metro del suelo**), mientras que en el **oeste de la zona**

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas Galicia La Segunda San Cristóbal Seguros Grupo Sancor Seguros

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
BCR

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR

GEA estos valores se reducen a acumulados entre **40 y 100 mm**.



Extensión GEA: O de Córdoba, N de Santa Fe, Santiago del E. y Chaco

Segunda quincena de marzo: mejores lluvias y descenso de temperatura

La primera quincena de marzo culmina sin soluciones pluviales para el corazón de la zona núcleo, pero con la **perspectiva de alivio durante la segunda mitad del mes.**

La persistencia de un bloqueo atmosférico sobre la porción central de la región pampeana, asociado a la posición del anticiclón del Atlántico —un intenso centro de alta presión situado frente a la costa este de Argentina— **impidió durante los últimos 45 días el ingreso de los sistemas frontales hacia el centro del país.**

El resultado fue una virtual barrera de circulación que **dificultó el avance de las lluvias y tormentas más allá del centro bonaerense, La Pampa y la franja oeste** de la región pampeana llegando hasta el norte del país. Es decir, **una campana invisible que mantuvo ausentes las lluvias sobre el sudeste de Córdoba, centro/sur de Santa Fe, entre Ríos y norte de Buenos Aires.**

Como consecuencia, las precipitaciones de marzo tuvieron un comportamiento dispar, que benefició fundamentalmente al **sudeste bonaerense, La Pampa, la franja oeste mediterránea y el norte del país**.

Todos estos sectores, exentos de la influencia del centro de alta presión, recibieron volúmenes de agua, todavía **insuficientes, pero adecuados a los niveles estacionales**, incluso dentro de los valores estadísticos normales.

Con esta distribución, las reservas de humedad siguen siendo escasas en la zona núcleo, con una amplia cobertura de la condición de sequía. Pero han alcanzado una buena recuperación en La pampa, oeste de Córdoba, Buenos Aires desde el centro hacia el sudeste y parte del NOA, precisamente en los sectores que recibieron agua de manera más generosa.

Desde el inicio del 2023, además de la profunda sequía, el trimestre cálido se comportó particularmente hostil en lo que respecta a las temperaturas. Tanto enero como febrero se caracterizaron por las **temperaturas extremas y las olas de calor** y en ese sentido el último mes del verano mantuvieron la tendencia.

Los primeros quince días del mes fueron una continuidad de temperaturas extremas, tanto máximas como mínimas superaron la marca más alta para el mismo mes en más de 100 años. Las mínimas alcanzaron los mismos valores que normalmente se consideran como registro máximo diario para marzo.

Una quincena completa de elevadísimas temperaturas sin respiro y lluvias escasas sobre los sectores más necesitados

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas Galicia La Segunda San Cristóbal Seguros Grupo Sancor Seguros

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
BCR

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.
FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR

de agua, pero que finalmente comienza a mostrar un cambio.

Según los pronósticos, en el inicio de la segunda quincena, el bloqueo comienza a desplazarse hacia el este y la circulación de los sistemas frontales aumenta su incursión hacia el centro del país. Esto provocará un cambio de masa de aire, un descenso generalizado de las temperaturas y el desarrollo de lluvias y tormentas que, aunque todavía erráticas y dispares, aumentarán su área de cobertura hacia el centro del país.

Es razonable esperar que en los próximos días se resuelva positivamente la circulación de escala regional y los frentes asociados a la transición estacional, comiencen mejorar la dinámica pluvial en un entorno de temperaturas más acordes a la época del año.



GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas Galicia La segunda San Cristóbal Seguros Grupo Sancor Seguros

BCR DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR