



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 05 de marzo de 2026 – N° 959 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

Con el 10% del maíz temprano ya cosechado, los primeros rindes de la región núcleo rondan los 100 qq/ha


El miedo a otra violenta tormenta disparó la trilla en los últimos días. Las primeras 150.000 ha cosechadas muestran las marcadas diferencias que hay entre zonas; mientras el oeste supera los 105 qq/ha, en buena parte del este los rindes van de 70 a 80 qq/ha.

Lluvias intermitentes

Se espera una mejora de las condiciones a partir del sábado 7, pero la probabilidad de chaparrones y tormentas retorna a partir de la tarde del **domingo**.

"Marzo inicia con lluvias pero persisten déficits en el este", dice el consultor **Elorriaga**.


Primera semana de marzo acentúa el patrón de lluvias en el oeste y tormentas de carácter violento



Idiazábal, Monte Buey, Bengolea, Hernando, Canals, Laboulaye y Bellville recibieron **50 a 64 mm** en los últimos 7 días. En el este están los menores registros: Santa Teresa, Zavalla, Chovet, Rosario, Pergamino, Ramallo y Baradero, en ese orden, recibieron de **22 a 2 mm**. El **oeste** sigue siendo **privilegiado** por las lluvias en esta campaña de granos gruesos, pero las lluvias están siendo acompañadas por **violentos episodios**, esta vez con **vientos muy intensos**. En la tormenta del lunes 2 a la noche hubo ráfagas que provocaron caída de árboles y cortes de luz. Esta vez el granizo ha caído muy aislado, a diferencia de la semana anterior cuando barrió **alrededor de 30.000 ha maiceras** en el corredor de Armstrong a Inriville. **El temor a otra violenta tormenta ha disparado la trilla en los últimos días**. El recuerdo del fenómeno está muy presente en la región y se está trabajando en largas jornadas para anticiparse a las nuevas tormentas pronosticadas para los próximos días.

El 10% de cosecha del maíz de 1ra delimita amplias diferencias en los rindes de la región núcleo

Rindes Maíz Temprano Región Núcleo (qq/ha)



GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 05 de marzo de 2026 – N° 959 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

La primera "foto" de la cosecha del maíz de 1ra, con un 10% de avance, muestra dos componentes que, al parecer, caracterizarán al ciclo 2025/26. Lo primero es que el promedio de la región, 100 qq/ha, parece satisfactorio, ya que cumple con el **nivel promedio de la región (97 qq/ha)**. Lo segundo es que salta a la vista que **la distribución de rindes es muy dispar: una amplia zona de la región núcleo ha quedado muy por debajo de los promedios**. Se trata de la **franja este**, sobre todo en los alrededores de Rosario y hacia el sur, con un departamento de Constitución muy golpeado por la falta de agua. Como se observa en el mapa de rindes parciales de la región, **en buena parte del este hay rindes de 70 a 80 qq/ha, mientras que el oeste supera los 105 qq/ha**. Otra característica de esta campaña es que, aún en áreas con buenos rindes promedios, **hay zonas con grandes brechas entre rindes**, como en Marcos Juárez, con **95 quintales de diferencia** entre techos y pisos. Para tener en cuenta, al 24 de febrero del 2026, el rinde de indiferencia calculado para el maíz temprano en situación de alquiler era de **98 qq/ha**.

¿Cómo avanza la cosecha y qué rindes salen de cada zona de la región?

En el **centro-sur de Santa Fe**, donde el avance llega al 13%, los resultados se mueven en torno a los 100 qq/ha. En Carlos Pellegrini, los primeros lotes cosechados oscilan entre 120 y 90 qq/ha. Al sur de la provincia, el avance es del 19%. En Bigand, por ejemplo, ya se levantó el 35% del área, con rindes que rondan los **90 qq/ha**. En Venado Tuerto, con apenas un 2% cosechado, los primeros lotes —de ciclos más cortos— están mostrando rindes **superiores a los 100 qq/ha**, con picos de hasta 130 qq/ha. En el norte bonaerense, en la zona de Colón, el ánimo es optimista. Con apenas un 5% cosechado, los técnicos destacan el potencial de la campaña: "los primeros rindes vienen muy bien, todos arriba de 100 quintales". Incluso mencionan lotes "cerrados" con promedios de 125 a 145

qq/ha, y **picos de hasta 210 qq/ha en planteos que destacan por su nivel de manejo**.

En tanto, el sudeste de Córdoba lleva alrededor del 5% de avance. En Marcos Juárez, los rindes promedio se ubican en **120 qq/ha**, aunque con una variabilidad muy marcada, que va desde **70 hasta 165 qq/ha**.

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea



FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 05 de marzo de 2026 – N° 959 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO



GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR




BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 05 de marzo de 2026 – N° 959 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

SUBZONAS Y RED DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS GEA



SUBZONA I

En **Carlos Pellegrini**, la soja de primera se encuentra en muy buenas condiciones: los primeros lotes ya finalizaron el ciclo y transitan la etapa de **madurez**. El inicio de cosecha se estima hacia fin de marzo. **"Nuevas lluvias ya no tendrían un impacto significativo en el rinde de los lotes más avanzados"**. La proyección de rinde se ubica en torno a los **50 qq/ha**. En soja de segunda, las últimas lluvias permitieron una **muy buena recuperación**. El cultivo continúa desarrollándose y compensando las pérdidas durante la sequía; de mantenerse condiciones climáticas favorables, podría expresar su máximo potencial en la mayoría de los lotes, con una estimación cercana a **35 qq/ha**. En cuanto al maíz temprano, la cosecha presenta un **5% de avance**, con rindes promedio de **100 qq/ha**, mínimos de 90 y máximos de 120 qq/ha.

En la zona de **Cañada de Gómez** y alrededores, en los últimos días se registró un **fuerte avance de la cosecha de maíz**, en muchos casos con el objetivo de adelantarse

a las tormentas pronosticadas. Esta dinámica llevó a que algunos lotes se levanten con humedad por encima del umbral de comercialización. En cuanto a los rindes, los técnicos relevan un rango amplio que va de **80 a 120 qq/ha**, con los valores más bajos asociados a ambientes de menor calidad. **En los mejores lotes, donde se proyectaban 120 a 125 qq/ha, los resultados efectivos se ubican más bien entre 100 y 110 qq/ha**. Hacia Villa Eloísa, los rindes oscilan entre **95 y 125 qq/ha**, mientras que en el área afectada por granizo en Armstrong los registros caen de **60 a 70 qq/ha**.

Desde **María Susana**, los técnicos que también trabajan en otras zonas hacen un repaso de la cosecha maicera en la zona. "Con un 95% de avance, en Acebal el promedio es **74 qq/ha**, en Julio V. López, **110 y 127**, en Cañada Rosquin y El Trébol **110 a 130**. En Gobernador Crespo, y ya hacia el norte de Santa Fe, **vemos 94 qq/ha**". Para la soja de 1ra, el inicio de cosecha se estima en **15 a 20 días**, "no tiene más tiempo para aumentar rinde solo puede ganar algo por llenado de grano las tardías". En la de segunda, **"las lluvias aún tienen impacto para favorecer el cultivo**, sobre todo mejorando el llenado de grano. Pero, estimamos que estaremos **por lo menos en un 20% por debajo de un año normal**".

Desde **Aldao**, comentan que **"el efecto de la falta de agua fue contundente y resentirá con fuerza los rindes"**. Explican que la zona más castigada de la región se forma con **Lucio V. López, Soldini, Arminda, Casilda y Pujato**. En maíz, solo los más tempranos, los de la 1ra semana y 2da de setiembre lograron alcanzar los **95 a 100 qq/ha**. El resto quedó entre los **70 a 85 qq/ha**. En soja, **"no alcanzamos ni la sombra de los rindes del año pasado"**. Estiman para la de 1ra **30 qq/ha** y para la de segunda **20 qq/ha**.

SUBZONA II

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 05 de marzo de 2026 – N° 959 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

En **Bigand**, las últimas lluvias fueron claves para frenar la caída del rendimiento de la soja de primera. Sin embargo, hay un **55%** de los cuadros que se los califica como **regulares**. El resto, entre buenas a muy buenas condiciones. Hacia el sur de la región se observan los mejores escenarios, con expectativas cercanas a los **40 qq/ha**. En los sectores más afectados los rindes podrían ubicarse en torno a los **35 qq/ha**. Esto configura un promedio zonal estimado de 38 qq/ha. La cosecha se proyecta para fines de marzo y principios de abril. Fenológicamente, el cultivo se distribuye entre **plena fructificación e inicio y plena formación de semilla** (R4 a R6), con un 40% comenzando madurez. La soja de segunda **fue la más golpeada por la sequía**, con **situaciones críticas donde las lluvias ya no lograrán revertir el daño**. Solo en pocos lotes se observó una recuperación favorable. **En términos generales, el cultivo no logró recomponerse** y los rindes no mostrarán mejoras significativas. La proyección promedio se ubica en **25 qq/ha**, con una proporción importante del área (65%) en condición regular a mala como consecuencia del estrés térmico e hídrico. En cuanto al maíz temprano, la cosecha avanza sobre el **35% del área**, con un rinde promedio de **90 qq/ha**, mínimos de 75 y máximos de 130 qq/ha.

En **Bombal**, la soja de primera se encuentra en muy buen estado y no se esperan cambios relevantes en los rindes con nuevas lluvias. El cultivo se encuentra en llenado de granos (R6). El rendimiento estimado ronda los **45 qq/ha**. La soja de segunda "muestra una evolución **excelente**, sin signos de deterioro. Si se concretan nuevas lluvias, el escenario **podría ser aún más favorable**", señalan los técnicos. Hoy el rinde proyectado se sitúa en torno a los **38 qq/ha**, con el cultivo transitando el inicio de fructificación (R3). En cuanto al maíz temprano, la cosecha aún no ha comenzado.

En la zona de **Venado Tuerto, Murphy** y alrededores, la tormenta se hizo sentir **"con ráfagas fuertes que**

provocaron caída de árboles y algunos cortes de luz, aunque finalmente no resultó tan severa como se temía", dicen en los técnicos. Los acumulados de lluvia oscilaron en torno a los **23 a 25 mm** en promedio, con sectores que alcanzaron los 30 mm y otros registros más modestos. Hubo **caída aislada de granizo**, pero sin daños de consideración en el área de Venado Tuerto. En cuanto a los cultivos, el maíz se encuentra en buenas condiciones: "los primeros lotes, de ciclos más cortos, ya comenzaron a cosecharse, con **rindes que superan los 100 qq/ha** y picos que llegan **hasta 130 qq/ha** en los mejores casos. La soja, tanto de primera como de segunda, "muestra un **buen desempeño general y evoluciona de manera favorable**", explican en el área.

SUBZONA III

El martes se registró en **Colón** una tormenta **con ráfagas intensas** que dejó en promedio unos **20 mm sin generar daños** en los cultivos. **"Estos milímetros vienen bien para la soja de segunda, que era la que estaba más complicada"**, señalan desde la zona. Explican que este año el trigo extrajo una importante cantidad de agua y nutrientes que no llegaron a compensarse, por lo que cuando apenas se cortó el agua, el rinde cayó. En soja de segunda, estiman que **de la ruta 8 hacia el sur los promedios están en los 30 qq y de la ruta 8 hacia el norte, hacia Pergamino, 20 qq**. La soja de primera, en cambio, muestra un escenario más favorable: "se la aguantó bien", destacan, y proyectan **promedios de 40 qq/ha, con techos que podrían alcanzar los 55 qq/ha**. El cultivo ya transita la recta final: **"está terminando el llenado y comienza a entregarse"**. Respecto al maíz, comentan que la cosecha comenzó con un avance del **5%** y expectativas muy positivas. "Va a ser una cosecha **espectacular**. Los primeros rindes vienen muy bien, todos **arriba de 100 qq**", afirman. Incluso mencionan lotes cerrados con promedios de **125 a 145 qq/ha**, "en estos

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 05 de marzo de 2026 – N° 959 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

últimos hubo picos de **210 qq/ha**. Son lotes buenos y bien fertilizados", explican.

SUBZONA IV

En la zona de **Junín** y alrededores, la tormenta del martes 3 dejó entre **20 y 30 mm**. Sin reportes de daños por viento o granizo, el agua suma a sostener la buena condición general de los cultivos. Los asesores resaltan que distinta fue la situación hacia el norte, **en dirección a Venado Tuerto, y hacia el oeste, rumbo a General Hacha (La Pampa), donde se registraron tormentas de mayor intensidad**. En cuanto al avance de campaña, todavía no comenzó la cosecha gruesa: "apenas se están realizando algunos picados de maíz, pero sin movimiento de cosechadoras". Las sojas de primera más tempranas recién empiezan a entregarse por lo que faltarán entre 20 y 25 días para que arranquen de lleno las tareas", explican y agregan que "hacia la zona de **Villegas, los cultivos también se mantienen en muy buen estado**".

SUBZONA V

En la zona de **Corral de Bustos**, el martes se registraron entre **30 y 35 mm** de lluvia. Aunque los técnicos aún no pudieron salir a recorrer los lotes (martes 3 por la mañana), advierten que **la tormenta estuvo acompañada por vientos muy fuertes y no se descartan posibles daños**. En cuanto a la cosecha de maíz, el avance es incipiente y apenas alcanza el **3%** de la superficie. Sin embargo, hacia el sector **oeste, donde el granizo** había impactado con fuerza en el evento anterior, el ritmo es algo mayor y se concentran más lotes ya cosechados.

En la zona de **Canals y alrededores**, la tormenta de la semana pasada dejó algunos episodios de granizo, aunque sin la gravedad observada sobre el corredor de la ruta 9, entre Armstrong e Inrville. En cuanto a los cultivos, la soja de primera se encamina a cerrar una **buena**

campaña, mientras que la soja de segunda se muestra más **ajustada y necesita nuevas lluvias para consolidar su recuperación**: "los últimos milímetros ayudaron a acomodar los lotes, pero no hay un cambio notable", dicen los técnicos. Agregan que **hacia el oeste, en cambio, se encadenaron tres eventos de lluvia que resultaron muy oportunos para los cultivos tardíos**, especialmente para los maíces tardíos y las sojas de primera implantadas en fecha alrededor del 15 de noviembre. Respecto a la cosecha, el avance es escaso y los rindes relevados muestran una amplia variabilidad, con valores que van de **75 a 80 qq/ha hasta 120 qq/ha**: "va a ser una campaña de **normal a buena**", resumen.

En **Marcos Juárez**, la soja de primera transita sus últimas etapas (plena formación de semilla y madurez) con el rendimiento prácticamente definido en la gran mayoría de los lotes. Los primeros cuadros se estiman para cosecha en aproximadamente 15 días. La estimación de rinde se ubica en torno a los **40 qq/ha**. En soja de segunda, si bien las lluvias mejoraron el estado general del cultivo, en términos productivos llegaron tarde. "Vamos a tener rendimientos por debajo del promedio de la zona", indican los ingenieros. Se estima un rinde de **25 qq/ha**. Los lotes se encuentran formando la semilla (entre R5 y R6), con una condición que oscila entre buena y regular. En cuanto al maíz temprano, la cosecha muestra un 10% de avance, con un rinde promedio estimado de **120 qq/ha**, aunque con **marcada variabilidad**: mínimos de 70 y máximos de 165 qq/ha.

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 05 de marzo de 2026 – N° 959 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

INDICADORES CLIMÁTICOS

Lo que viene, el pronóstico para la semana próxima en la región núcleo

Semana con lluvias intermitentes en la región

El periodo comprendido entre el **jueves 5 y el miércoles 11** de marzo comienza con inestabilidad favoreciendo la ocurrencia de **precipitaciones aisladas e intermitentes**, principalmente en el **centro/oeste de la zona GEA**. Las condiciones meteorológicas mejorarán paulatinamente a partir del **sábado 7**.

La probabilidad de **chaparrones y tormentas** retorna al **centro/oeste del área GEA** a partir de la tarde del **domingo 8** y se estima que se mantendrá hasta la **mañana del lunes 9**. Posteriormente, se espera buen tiempo hasta el final del periodo de pronóstico.

Las **temperaturas máximas** descenderán levemente a partir de hoy, jueves, alcanzando valores **entre 20 y 22°C** el viernes 6, posteriormente se espera un leve ascenso térmico, llegando a los valores más elevados de la semana, **entre 26 y 28°C**, el miércoles 11. Las **temperaturas mínimas** se mantendrán similares, de **16 a 19°C**, durante todo el periodo.

Lo que pasó con el clima en la última semana en la región núcleo

Lluvias de hasta 64 mm en la región

La semana comprendida entre el **jueves 26 de febrero y el miércoles 4 de marzo** se registraron precipitaciones de variada intensidad en la zona GEA. Los valores rondaron los **10 a 50 mm** con un área superior a los 50 mm, en el **sector oeste**. El máximo registro del periodo fue de **64 mm** y se midió en **Idiazábal**, Córdoba.

Las **temperaturas máximas** rondaron entre **30 y 34°C**. Los valores más elevados se midieron en el centro de la zona GEA y los más bajos en el sudoeste. El registro más alto del periodo, **33,8°C**, se midió en la localidad de **Godeken**, en Santa Fe. Las **temperaturas mínimas** rondaron los **8 a 13°C**, con los valores más bajos en sudeste del área GEA y los más elevados en el sector norte/noreste. El mínimo extremo del periodo, **8°C**, se midió tanto en la localidad de **Chacabuco** como **Junín**, en Buenos Aires.

Con este panorama el área de reservas escasas se redujo y se centra en **el sudeste de la zona GEA**, mientras en el resto de la región las condiciones son **regulares a óptimas**. Cabe destacar que en la porción **centro/este**, aún quedan núcleos de **sequía**. Con las actuales condiciones, en los próximos quince días, se requieren precipitaciones que acumulen entre **80 y 100 mm** en el centro y sudeste de la zona GEA, mientras que en el oeste los valores se reducen a registros entre **20 y 60 mm** para alcanzar condiciones óptimas de humedad.

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea


FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 05 de marzo de 2026 – N° 959 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO



Podemos decir que febrero concluyó con recurrencia de lluvias y tormentas pero manteniendo un suministro selectivo que **priorizó la franja oeste sobre el este.**

Marzo comenzó con una **distribución más generalizada**, prácticamente toda la **región pampeana y Santiago del Estero** recibieron lluvias con volúmenes de agua más generosos, en el orden de los **15 a 60 milímetros**, aunque manteniendo cierta reticencia a que los desarrollos se extiendan hacia la **franja este.**

La transición mensual se realizó con **lluvias y tormentas**, pero manteniendo una **disparidad** que explica la condición **deficitaria** que predomina en los suelos de gran parte de la provincia de **Buenos Aires y del sudeste de Entre Ríos.**

Extensión GEA: O de Córdoba, N de Santa Fe, Santiago del E. y Chaco

Marzo inicia con lluvias pero persisten déficits en el este

Los últimos siete días le dieron un cierre adecuado a las lluvias de febrero y mostraron un promisorio arranque pluvial para marzo.

Si bien las precipitaciones con las que se despidió el segundo mes del año no fueron particularmente intensas ni generalizadas, colaboraron para que la provincia de **Córdoba, La Pampa y la franja norte de la región pampeana** cubrieran, e incluso **superaran**, los **valores normales históricos del mes.** Distinto fue el caso del **sudeste bonaerense y parte del Chaco** que, a pesar de las lluvias recibidas, quedaron por **debajo de los registros estadísticos.**

Las precipitaciones quebraron los bloqueos de enero, pero los auxilios pluviales más contundentes privilegiaron la **franja oeste** y principalmente a **Córdoba**, algunos sectores de **La Pampa** y parte del **centro norte de Santa Fe.**

Las reservas de agua en la región pampeana copian de manera fiel el comportamiento de las lluvias y tormentas. El **nivel de humedad en los suelos** presenta un gradiente en **disminución diagonal de noroeste**, donde el estado es **óptimo**, hacia el **sudeste**, donde **Buenos Aires** muestra el **mayor déficit.** Pasando por una franja intermedia que cubre, con **reservas regulares**, **La Pampa**, el **noroeste bonaerense**, el **sur de Santa Fe y de Entre Ríos.**

La **primera semana de marzo** se inició con **lluvias**, y los pronósticos muestran un cambio de masas de aire que promueve **inestabilidad** y el **desarrollo de precipitaciones intermitentes** que se extienden hasta el final de la misma. El inicio es bueno pero, por el momento, la probabilidad que estos **aportes de agua** alcancen las **zonas más deficitarias** es **baja.**

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR




BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA

Guía Estratégica para el Agro

Semana al 05 de marzo de 2026 – N° 959 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO



GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR