



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 12 de marzo de 2026 – N° 960 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

La falta de agua del verano le descontó más de 1 Mt de soja a la región núcleo

Hoy se estiman 16,1 Mt de producción respecto de los 17,2 Mt que se estimaban un mes atrás. A la soja de primera se le acabó el tiempo; la mitad de los lotes ya está entrando en madurez. La de segunda todavía puede rescatar algunos quintales extras si acompañan las lluvias de marzo.

Semana de tiempo inestable

Las lluvias ganarían protagonismo desde el sábado y volverían entre el lunes a la noche y el martes con el paso de un frente frío.


"Los pronósticos de corto plazo no prevén lluvias significativas sobre el centro del país hasta el comienzo de la segunda quincena del mes", dice el consultor Elorriaga.

La sequía y el calor pasan factura, ya que se descuentan más de 1 Mt en la soja de la región núcleo


La **segunda estimación** de soja para la región núcleo confirma un importante recorte en la región, **1,1 millón de toneladas menos** con respecto a febrero. De 17,2 Mt de soja que se estimaban hace un mes, la **nueva estimación** es de **16,1 Mt**. El cultivo se sembró con buenas reservas en los suelos y las lluvias acompañaron el desarrollo del cultivo hasta la última semana del 2025. A partir de allí, la sequía, la ola de calor en enero y los eventos de tiempo extremo de febrero doblegaron al cultivo.

Los **mayores recortes** se concentran en el **centro-sur de Santa Fe** y el **noreste bonaerense**, donde los cultivos sintieron con más fuerza el impacto del estrés hídrico y térmico del verano.

Rindes de Soja en Región Núcleo



Otro de los grandes problemas, que aún se arrastra en la soja de segunda de la región tiene que ver con la recuperación pluvial de febrero. Esta recuperación sucedió en la segunda quincena de febrero y **dejó amplias zonas con menos del 40% de la media mensual** (110 mm) en la franja este. Mientras tanto, las lluvias de la primera parte de marzo **siguen preponderando en el oeste**.



GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR




BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 12 de marzo de 2026 – N° 960 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

También hay un importante impacto por el **área perdida**. En enero se estimaban 64.000 ha pérdidas de soja de 2da por la sequía, pero en febrero **se sumaron 100.000 ha de soja "barridas"** por la brutal tormenta de granizo y viento de hace tres semanas atrás en el corredor que va desde Armstrong, Tortugas y General Roca hasta Inrville.

El resumen, el ciclo sojero **2025/26 quedaría 2,3 Mt por debajo** del volumen obtenido el **año pasado** y también **por debajo del promedio de los últimos 15 años (17,4 Mt)**.



¿Qué se esperaba a la siembra?

El escenario trazado al principio de campaña era el de un promedio de **40 quintales por hectárea** en la región y, por lo tanto, cosechar **18 Mt**. Lo que se estima en marzo es un **rinde medio de 36,5 qq/ha**, que, a partir de un área sembrada de **4,58 M ha** y una **superficie perdida** cercana a **164.000 ha**, arrojaría una producción de **16,1 Mt**.

La soja de 1ra no tiene más tiempo para sumar rinde

La soja de primera de la región núcleo transita las últimas etapas de su ciclo, con el **55%** del área en la fase de **llenado de granos** y el **45%** en el **inicio de la madurez**. En unos **10 a 15 días** comenzaría la **cosecha** de los primeros lotes, por lo que la ocurrencia de nuevas lluvias

no tendría impacto significativo sobre el rinde. Se estima que el cultivo alcanzaría un rinde promedio de **41 qq/ha** en la región. En Carlos Pellegrini se estiman rindes cercanos a los **50 qq/ha**; en Bombal, alrededor de **45 qq/ha**. En Colón, promedios de **40 qq/ha** con máximos que podrían alcanzar los **55 qq/ha**; y en Marcos Juárez, las estimaciones se ubican en torno a los **40 qq/ha**. Pero en las zonas que no lograron recomponer la humedad en febrero, el panorama es menos alentador; en Bigand, pese a que las últimas lluvias frenaron el deterioro, el **55%** de los lotes se califica como **regular** y los rindes se ubicarían cerca de **35 qq/ha**, con máximos de **40 qq/ha** en los mejores ambientes. En Aldao advierten que "no se alcanzó ni la sombra de los rindes del año pasado", con estimaciones en torno a **30 qq/ha**. Más allá de las estimaciones, el guarismo final se verá cuando las cosechadoras comiencen a hacer su trabajo.

La soja de 2da exhibe rindes muy dispares y expectativas atadas a nuevas lluvias

La mayor parte de la soja de 2da se encuentra entre **plena formación de chauchas** y **llenado de granos**. La ocurrencia de nuevas lluvias aún podrían favorecer el **llenado** y mejorar los **rindes finales** en parte de la región. En **Carlos Pellegrini**, con lluvias en los próximos días, el cultivo todavía podría expresar gran parte de su potencial, con estimaciones cercanas a **35 qq/ha**. En **Bombal**, el rinde proyectado ronda los **38 qq/ha**, y los técnicos señalan que un **nuevo aporte de agua** podría mejorar ese escenario. Sin embargo, en otras zonas, el daño provocado por la **sequía** ya resulta **difícil de revertir**. En **Colón** explican que el trigo previo extrajo una importante cantidad de agua y nutrientes, parámetros que no llegaron a recomponerse. Por eso, cuando se interrumpieron las lluvias, el rinde cayó rápidamente. Allí estiman promedios de **30 qq/ha** al sur de la ruta 8 y cerca de **20 qq/ha** hacia el norte, en dirección a Pergamino. En **María Susana** proyectan rindes al menos **20%** por debajo de un año normal, mientras que en **Aldao** se estiman valores

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR





BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 12 de marzo de 2026 – N° 960 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

cercanos a **20 qq/ha**. En Bigand y **Marcos Juárez**, las lluvias de febrero no lograron recomponer el cultivo y la proyección promedio se ubica en **25 qq/ha**.



GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 12 de marzo de 2026 – N° 960 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

INDICADORES CLIMÁTICOS

Lo que viene, el pronóstico para la semana próxima en la región núcleo

Semana con tiempo inestable y mejorías temporarias

El periodo comprendido **entre el jueves 12 y el miércoles 18 de marzo** comienza con estabilidad que **se mantendrá hasta la tarde del viernes 13**, cuando no se descarta la ocurrencia de algún chaparrón aislado en el sudoeste de la zona GEA.

La **probabilidad de precipitaciones generalizadas aumenta** durante el **sábado 14**. Posteriormente las condiciones mejorarán de manera temporal, ya que entre la **tarde del lunes 16 y la madrugada del martes 17 se esperan chaparrones** y tormentas aisladas prefrontales sobre el este de la zona GEA. Durante la mañana del mismo día **martes un frente frío se estará desplazando** por la región provocando **lluvias y tormentas más generalizadas**. Las **condiciones meteorológicas tienden a mejorar en el final del periodo de pronóstico**.

Las **temperaturas máximas ascenderán paulatinamente** alcanzando los valores más altos, entre **30 y 33°C**, durante el **lunes 16 de marzo**. Posteriormente **la masa de aire cambiará y se notará principalmente el miércoles 18**, cuando el frente frío ya se haya desplazado hacia el norte acompañado por un descenso térmico.

Las **temperaturas mínimas se mantendrán constantes**, entre **14 y 17°C**, durante la primera parte del periodo de pronóstico pero, a partir del **domingo 15**, habrá un leve aumento en los valores de temperatura mínima, que descenderán nuevamente a partir del **miércoles 18**, principalmente en el sur de la zona GEA.

Lo que pasó con el clima en la última semana en la región núcleo

Lluvias dispares sobre GEA

La semana comprendida entre el **jueves 5 y el miércoles 11 de marzo** se registraron **precipitaciones con una distribución dispar**.

Los valores más importantes, **entre 10 y 40 mm**, se localizaron en **Córdoba, parte de Santa Fe y norte de Buenos Aires**. El **máximo registro** del periodo fue de **49 mm** y se midió en **Pujato, Santa Fe**.

Las **temperaturas máximas** rondaron entre **27 y 32°C**. Los valores más elevados se midieron en el este de la zona GEA y los más bajos en el sur y noroeste. **El registro más alto del periodo, 31,9°C**, se midió en la localidad de **Ramallo**, en Buenos Aires.

Las **temperaturas mínimas** rondaron los **10 a 16°C**, con los valores más bajos en el sudeste del área GEA y los más elevados en el sector norte. **El mínimo extremo del periodo, 10,3°C**, se midió en las localidades de **Chacabuco y Junín**, ambas en Buenos Aires.

Con este panorama el área con **reservas escasas** se mantiene en la **porción sudeste de la zona GEA**, mientras que **en el resto de la región** las condiciones son de **regulares a adecuadas**. Cabe destacar que en el centro/este aún quedan núcleos de sequía.

Con las actuales condiciones, en los próximos quince días, **se requieren precipitaciones que acumulen entre 60 y 80 mm en el sudeste de la zona GEA**, con un **núcleo de 100 a 120 mm en el sector central**. En la zona oeste y norte, los valores se reducen a registros entre 20 y 60 mm para alcanzar condiciones de humedad óptimas.

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea


FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 12 de marzo de 2026 – N° 960 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO




Extensión GEA: O de Córdoba, N de Santa Fe, Santiago del E. y Chaco

Primera década de marzo con ambiente otoñal

La **primera década de marzo** transcurrió con un **comportamiento ambiental más propio del otoño** que de finales de verano.

Temperaturas templadas y una **circulación más fría del este/sudeste**, favorecieron un requerimiento atmosférico menos exigente para los cultivos implantados. **Mañanas frescas** pero sin descensos excesivos, tardes con temperaturas dentro de un rango moderado, con valores elevados durante las horas de insolación pero sin continuidad como para potenciar fuertemente la pérdida de humedad, y **noches templadas** con una adecuada provisión de **rocío matutino**, fueron factores de compensación positiva mitigando en parte el impacto de la prolongada escasez pluvial sobre las siembras muy poco favorecidas por la ausencia de lluvias en la franja este de la región pampeana.

Las mismas condiciones de circulación confrontaron con un **mayor contenido de humedad** atmosférica en la **franja oeste y noroeste del país** provocando **precipitaciones recurrentes y de buen volumen**, aunque con bastante disparidad geográfica. **Acumulados** en un rango desde los **10 a los 230 milímetros**, con **valores atípicos** y un récord de **237 milímetros** en **Santiago del Estero**, mayor acumulado para la primera década en 65 años, con una distribución en la que la peor parte, registros entre **0 y 10 milímetros**, se la llevan el **sudeste entrerriano y la franja centro/este de Buenos Aires**. Sectores donde las precipitaciones han sido



GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 12 de marzo de 2026 – N° 960 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

recurrentemente esquivas debido, principalmente, al escaso contenido de humedad aportado por la circulación sudeste desde el Atlántico.

Marzo, por el momento, **no ha colaborado con las zonas más secas del sudeste pampeano**, donde las reservas de agua son exiguas y los cultivos continúan demandando. Por el contrario las **mejoras se han vuelto notorias en La Pampa, Córdoba y el centro santafecino**, donde las lluvias del mes fueron muy generosas quitándole presión al tramo final de la campaña.

Los **pronósticos de corto plazo no prevén lluvias significativas sobre el centro** del país hasta el comienzo de la segunda quincena del mes, a partir de ese momento aumenta la probabilidad de que la franja sudeste bonaerense reciba algunas lluvias moderadas cambiando parcialmente la tendencia, pero con menor chance de que los desarrollos avancen hacia el resto de la provincia.

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



BCR

DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR