



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 6 de agosto de 2026 – N° 981 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

Tiempo frío y seco, necesidad inminente para cosechar maíz tardío y frenar al trigo y las enfermedades

Un julio muy húmedo y cálido dejó a casi la mitad del maíz tardío sin poder cosecharse y se teme por el daño ocasionado. En trigo, hay un llamativo adelantamiento fenológico con lotes encañando y un gran temor a que exploten las enfermedades.


Se van los días grises: vuelven el sol y el frío

El periodo del 6 al 12 de agosto comienza con un mejoramiento de las condiciones meteorológicas. **El lunes se esperan heladas en la región.**

"El flujo polar, instalado en la Patagonia, no ha logrado avanzar con suficiente consistencia como para vencer la circulación cálida y húmeda del noreste, que se ha mantenido predominante", dice el consultor Elorriaga.

¿El tiempo nublado, húmedo y cálido puede ser una limitación para alcanzar un trigo de alto potencial?

Hace un mes nos preguntábamos si el trigo de esta campaña tenía chances de acercarse al record de 60 qq/ha como rinde promedio del ciclo pasado. **"Extremadamente difícil"**, respondían los técnicos, pero quedaba abierto el desafío de **lograr 50 qq/ha**. Hay que recordar, que la media histórica de la región desde el 2010 es de **37 qq/ha**. Entonces, esta semana la consulta fue **si la falta de radiación y frío podían ser una limitante**. En el análisis de la red de estaciones GEA/BCR, la **radiación diaria media entre el 1ro de junio y el 31 de julio** muestra que este año **la región recibió entre un 20 y 40% menos de radiación que el 2025 comparando ambos periodos**.



El año pasado, a pesar de un julio récord de lluvias, **solía llover de noche**. El sol y el frío, dos variables claves para el rinde del trigo (que forman un índice, "el cociente fotothermal", que analizamos al final) fueron **óptimos y pilares** de los 60 qq/ha que se obtuvieron en la campaña pasada. No obstante, al preguntar en las encuestas por este efecto de la nubosidad, la humedad y las mayores temperaturas, los técnicos nos sorprendieron, señalando:

1-El mayor peligro lo está corriendo ahora mismo no el trigo sino el maíz tardío que falta por cosechar.

2- Hay un llamativo adelantamiento fenológico del trigo y hay lotes que ya están encañando cuando tendrían que hacerlo por lo menos después del 15 de agosto.

3-Si bien no hay enfermedades generalizadas, el potencial peligro de infestación es muy alto.

4-A pesar de la mayor falta de radiación, las altas temperaturas muestran trigos creciendo en muy buenas condiciones. En algunas localidades incluso se lo hasta mejor que el año pasado.

1-¿Qué está pasando con el maíz tardío?

Está faltando por levantar un **47%**, casi 150.00 ha, porque ante éstas condiciones la cosecha no ha podido avanzar durante todo julio. Y los técnicos de Alvear alertan: **"hoy nuestra gran preocupación pasa por la cosecha del maíz tardío. Ya estamos viendo lotes de sorgo brotados. Nadie quiere ir a ver cómo están los maíces. Nos da realmente miedo"**.

2-Hay un fuerte adelantamiento fenológico del trigo

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 6 de agosto de 2026 – N° 981 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

“Están muy lindos, pero más adelantados de lo que deberían. Generalmente empiezan a marcar el primer nudo entre el 15 y el 25 de agosto. Es más, hay algunos lotes que ya están por empezar a encañar”, señalan en Corral de Bustos. Y agregan: “no sé si es bueno o malo que estén adelantándose. Con el tiempo, lo sabremos”. Lo mismo comentan los técnicos de María Susana: **“empieza a preocupar un aparente anticipo de encañado”,** y señalan también: “hay un **gran desarrollo radicular** gracias a la alta humedad y puede alcanzar horizontes más profundos, tener más acceso a nutrientes. Tenemos los pro y contras de este invierno tan atípico”.

3-Hay un alto potencial para desarrollar grandes focos de enfermedades en trigo


“Las enfermedades progresarán, de hecho ya se ven manchas por tizón bacteriano”, advierten en Pergamino. “Las condiciones son altamente predisponentes a infecciones. **Peligro por los hongos, hay, pero por ahora el cultivo está bien”,** dicen el General Pinto. “Al trigo le falta un invierno **lógico**. Un año así no es para el trigo. **Aparte tenemos un ambiente ideal para que las enfermedades despierten y exploten.** Rogamos que no se despierten, si se levanta el **fusarium**, va a ser un problemón. Vamos a terminar rogando por alcanzar trigos de 35 qq/ha”, advierten en Alvear. **“Necesitamos al menos 15 a 20 días de frío y sol, que limpie y nos dé tiempo con las enfermedades”,** concluyen los técnicos.

4-A pesar de la menor radiación, el trigo está creciendo en muy buenas condiciones

Desde Marcos Juárez señalan que el cultivo se encuentra en pleno macollaje, con un buen número de macollos, y aseguran que los días nublados no han tenido efectos visibles hasta el momento. En Bigand destacan, **“los trigos están muy buenos, macollando. No se observan problemas relacionados con la falta de luminosidad. De hecho, en cuanto a la densidad y conformación de macollos, viene todo muy bien, estamos logrando unos**

500 a 600 macollos por m²”. Más al sur, en San Gregorio dicen que **“los lotes están macollando, con mejor estado de cultivo que el año pasado no se observa una limitante en el crecimiento del cultivo. Pero seguramente la falta de radiación no están permitiendo lograr la máxima tasa de crecimiento”.** En Pergamino lo explican así: **“el incremento en las temperaturas a finales de Julio le cayó bien al cultivo. Aceleró su crecimiento, acumuló biomasa, logró uniformidad y tomó color por la absorción de nitrógeno. El número de macollos será muy bueno”.** En General Pinto concluyen: **“vemos que es mayor el efecto de contar con tiempo cálido que la falta de luz. En los cultivos de coberturas o en las alfalfas parece que es setiembre”.**

¿Qué dicen los números?



Tomando como referencia del 1 de junio y el 20 de julio, el **ambiente radiativo y térmico de la región núcleo fue 21% menos favorable que en el mismo período de 2025.** La temperatura media **resultó 7% superior**, una combinación que reduce el valor del cociente fototermal y limita el potencial de macollaje. Este análisis del cociente fototermal Q ($\text{MJ m}^{-2}\text{día}^{-1}\text{°C}^{-1}$) es un indicador que integra la radiación solar y la temperatura y que **resume la calidad del ambiente para el crecimiento del trigo.** Para calcularlo se usaron datos diarios del reanálisis ERA5-Land (ECMWF) procesados en Google Earth Engine. Además, el análisis espacial revela que este deterioro no fue uniforme: **los valores más bajos del cociente fototermal** (representados con tonalidades más rojas en el mapa) **se concentran hacia el sudeste de la región núcleo,**

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 6 de agosto de 2026 – N° 981 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

precisamente donde predominan las mayores preocupaciones por la falta de crecimiento.

¿Qué significa esto? En esta etapa del cultivo, que comprende la emergencia y el macollaje, un menor cociente fotothermal todavía no define el número de granos, el principal componente del rendimiento. **Pero sí empieza a marcar el potencial de espigas que tendrá el cultivo.** Con menos radiación disminuye la fotosíntesis, el crecimiento y la producción de biomasa. Además, aumenta la competencia entre macollos y la planta prioriza el crecimiento del tallo principal, mientras que las temperaturas más elevadas aceleran el desarrollo fenológico. **En otras palabras, el trigo dispone de menos tiempo para producir y sostener macollos, por lo que podría reducirse el número de espigas por metro cuadrado.**


De todos modos, la buena noticia es que el potencial de rendimiento **aún no está definido**. Si durante el período crítico predominan días con mayor radiación y temperaturas moderadas, **el cultivo puede compensar parcialmente** este arranque menos favorable aumentando el número de granos por espiga.

¿Qué probabilidades hay de contar con una ventana de tiempo frío, seco y luminoso de acá en más?

Es una **muy buena noticia**, hay señales de cambio en el patrón de las condiciones climáticas que predominaron durante julio. Se espera una mejora de las condiciones meteorológicas por la **rotación del viento al sector sur y estabilidad y buen tiempo en los próximos 7 días**. Incluso, el lunes 10 de agosto **vuelven las heladas a la región** y se esperan mínimas de -2 y -4°C. "Si la posición del anticiclón del Atlántico que estuvo inyectando humedad se retira y pasa a ganar protagonismo la circulación fría, **hay buenas chances de tener condiciones más típicas del invierno**", dice Elorriaga.

Julio se despide con una violenta tormenta en la región

"En el último día de julio, la presencia de una atmósfera cálida con humedad en exceso, un sistema de baja presión instalado y el avance de aire frío desde el sudoeste, fue una combinación más que propicia para desencadenar **un intenso proceso de ciclogénesis**. Esto provocó descenso de las temperaturas, fuertes ráfagas de viento y el desarrollo de **tormentas intensas con abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo**", explica Elorriaga. De esta manera, las localidades del este terminan el mes con acumulados que **triplican la media mensual**. En Ramallo el total es de **79 mm**, en Baradero **65 mm** y en Rosario **58 mm**. En cambio, el resto del área termina con valores más acordes con la media estacional de julio. Como promedio de la región, julio 2026 termina con **22 mm** (la media histórica es de 20 mm), pero lejos del año pasado cuando las lluvias fueron récords en 40 años y la región terminó con un promedio de 52 mm.



GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea


FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 6 de agosto de 2026 – N° 981 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO



GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS


Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR



SUBZONAS Y RED DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS GEA



SUBZONA I

En **Carlos Pellegrini** cuentan como ven el trigo este año y lo comparan con lo que veían un año atrás. “Este año, con temperaturas invernales más elevadas que lo normal, se ve una **disminución en la cantidad de macollos**. También en cuanto al crecimiento, notamos que el cultivo se viene **desarrollando de manera acelerada** por las mayores temperaturas y la humedad que acompaña”. Por otro lado, se realizaron las **fertilizaciones en macollaje**, en lotes que no habían sido aplicados a la siembra por el alto costo de la urea de entonces. “Los volúmenes aplicados por ha son **ligeramente inferiores** al año pasado”, concluyen los técnicos. En cuanto a la presiembra de maíz, y respecto a la urea, dicen: “con valores estables en precios de fertilizantes y ante la proximidad de la siembra de maíz, **se están cerrando ventas**. Notamos un volumen en juego que sería **muy similar al de años anteriores**”.

“Buen día, estamos evaluando como está afectando tantos días de baja radiación y exceso de humedad al trigo. **Empieza a preocupar un aparente anticipo de encañado**”, dicen los ingenieros de **María Susana**. Si bien esta situación es leve por ahora leve, es una señal de alerta para los técnicos: “recién estamos evaluando, la semana que viene podremos tener un panorama más certero”, agregan. En cuanto a lo que es fertilización dicen que “solo se re fertilizarán unos **pocos lotes** que se los notaba con **alguna deficiencia**. En gral están bien nutridos, en especial por el **buen desarrollo radicular que gracias a la gran humedad puede profundizar horizontes más profundos y tener más acceso a nutrientes**. No todos los años son iguales, tenemos los pro y contras de este invierno **tan atípico**”.

“Más que lluvias fue una **tormenta de verano**”, dicen los técnicos de **Alvear** del evento que dejó importantes acumulados en zonas puntuales: **80mm** en Aldao, **50 mm** en Ibarlucea y Figuera. “**Hoy nuestra gan preocupación pasa por la cosecha del maíz tardío. Ya estamos viendo lotes de sorgo brotados. Nadie quiere ir a ver cómo están los maíces. Nos da realmente miedo**”, reconocen los técnicos. En cuanto al trigo y en cuanto está influenciando el tiempo nuboso y las mayores temperaturas de este julio, dicen: “falta frío y sol. Al trigo le falta un invierno **lógico**. Un año así no es para el trigo. **Aparte tenemos un ambiente ideal para que las enfermedades despierten y exploten**. Rogamos que no se despierten, si se levanta el **fusarium**, va a ser un problemón. Vamos a terminar rogando por alcanzar trigos de 35 qq/ha”. Y concluyen en el área: “**necesitamos al menos 15 a 20 días de frío y sol, que limpie y nos dé tiempo con las enfermedades**”.

SUBZONA II

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 6 de agosto de 2026 – N° 981 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

"Los trigos están muy buenos, macollando y presentando hasta el momento buena sanidad" resumen los técnicos de Bigand. En la zona prácticamente no llovió casi nada el finde semana pasado "2 a 3 mm", destacan. Respecto a la seguidilla que vienen sufriendo la región de días nublados y su posible impacto sobre el crecimiento del trigo explican: **"no se observan problemas relacionados con la falta de luminosidad. De hecho, en cuanto a la densidad y conformación de macollos, viene todo muy bien, estamos logrando unos 500 a 600 macollos por m2"**. En cuanto a la posibilidad de refertilización en trigo, explican que "se han venido realizando **ajustes** en la dosis de nitrógeno". "Se han aplicado distintas dosis para llevar a un promedio de N total de **125 a 140 unidades de N**". Y ¿Qué pasa con la precampaña maicera? Responden en la zona: "en cuanto a venta de semilla de maíz, muchas decisiones ya están tomadas con los híbridos comprados o reservados. **Hasta hay algunas consultas por ajuste de superficie con productores que quieren sumar algunas hectáreas más.** Podemos aseverar que la superficie de intención de siembra de maíz temprano para la Campaña 26/27 será **similar** a la anterior".

"Todos los lotes están macollando, con mejor estado de cultivo que el año pasado", destacan en San Gregorio sus técnicos. ¿Puede ser un problema la falta de luz para el trigo? En el área explican: **"no se observa una limitante en el crecimiento del cultivo**, pero seguramente, estos días nublados que se volvieron recurrentes y aportan poca radiación **no están permitiendo lograr la máxima tasa de crecimiento"**. "La cantidad de macollos/m2 que se está observando son los **normales por ahora**", destacan. En cuanto a la fertilización comentan, que en general ya se hicieron, apuntando a rendimientos **medios** e incluso para **altos potenciales**. Y con el maíz, ¿Qué pasa con la urea? "Las compras de fertilizantes destinadas al maíz también **se hicieron** con objetivos de rendimiento **medio y altos**", responde en el

área. En cuanto a las lluvias del fin de semana, "por suerte poco que destacar", responden: "fueron muy leves, dejaron 4 mm), y no generaron ningún daño en lotes".

SUBZONA III

Hablamos con los técnicos de Pergamino acerca de estas últimas semanas caracterizadas por mayores temperaturas y días nublados para saber cuál es el impacto que notan en los trigos de la zona. **"El incremento en las temperaturas a finales de Julio le cayó bien al cultivo. Aceleró su crecimiento, acumuló biomasa, logró uniformidad y tomó color por la absorción de nitrógeno. El número de macollos será muy bueno. Por supuesto, que las enfermedades progresarán también, de hecho ya se ven manchas por tizón bacteriano"**, destacan los técnicos. En cuanto a la posibilidad de reajustar dosis de nitrógeno explican: **"muchos han salido a fertilizar antes del cambio de tiempo del viernes pasado.** Al final, en Pergamino y Colón llovió poco". "En lugares puntuales como **Mariano H. Alfonso, Pinzón o La Violeta** ocurrieron lluvias copiosas, que podrían recargar los suelos antes de tiempo", destacan. En cuanto al maíz y la actividad de precampaña, dicen los técnicos que **"se activaron las compras de nitrogenados ante el rumor de una nueva escalada de precios. El mercado de fosforados, en cambio, está paralizado"**.

SUBZONA IV

En General Villegas los trigos están **muy buenos, "sin enfermedades, muy bien desarrollado, igual que el año pasado o mejor"**, dicen los técnicos ante los efectos del tiempo nublado y cálido. **"Las condiciones son altamente predisponentes a infecciones. Peligro por los hongos hay, pero está muy bien, contamos entre 3 y 4 macollos"**, agregan. Respecto al efecto de la mayor temperatura comentan: **"vemos que es mayor el efecto de contar con tiempo cálido que la falta de luz. En los**

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 6 de agosto de 2026 – N° 981 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

cultivos de coberturas o en las alfalfas parece que es setiembre". En cuanto a la presiembra de maíz, "la venta de urea **no se reactivó**", dicen. El precio está **70 dolares por arriba** del piso que en la zona fue de 580 U\$/t. "Es importante que el productor siga la **relación insumo producto y la compare con otros años para entender si es el momento o no de comprar**", agregan.

de fertilizantes vienen retrasadas con respecto a otros años".

SUBZONA V

"Los trigos están espectaculares", dicen los técnicos de Corral de Bustos. **"Están muy lindos, pero más adelantados de lo que deberían. Porque generalmente empiezan a marcar el primer nudo entre el 15 y el 25 de agosto. Es más, hay algunos lotes que ya están por empezar a encañar"**. También explican que hubo dos semanas que no se pudo sembrar, y esa 2da tanda, están un poco retrasados. "Quedaron un poco desfasados. Pero en general están **muy buenos también**". Respecto al efecto de la baja radiación solar que vien imponiendose, dicen: **"sí, acá también, muchos días nublados, pero también con temperaturas superiores a lo normal y eso ayuda a que estén lindos. No sé si es bueno o malo que estén adelantandose. Con el tiempo, lo sabremos"**.

"El cultivo se encuentra en **pleno macollaje, con buen número de macollos y en condición normal**", resumen los técnicos de **Marcos Juárez**. Sin efectos por los días nublados, **aunque con una tasa de crecimiento importante sobre el desarrollo foliar por las mayores temperaturas de las últimas semanas, el cultivo viene desarrollándose en muy buenas condiciones**. Con respecto a los fertilizantes, en la zona recuerdan que "la gran mayoría de los lotes se fertilizaron con el total de lo planificado a la siembra. De todas maneras hubo algunos casos de **refuerzos** en las dosis y "se realizaron estos últimos días fertilizaciones pensando en las lluvias que al final no ocurrieron en nuestra zona". En cuanto a la precampaña maicera en la zona comentan que **"la compra**

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 6 de agosto de 2026 – N° 981 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

INDICADORES CLIMÁTICOS

Lo que viene, el pronóstico para la semana próxima en la región núcleo

Se van los días grises: vuelven el sol y el frío

El periodo del 6 al 12 de agosto comienza con un **mejoramiento** de las condiciones meteorológicas durante la tarde a noche del mismo día jueves. Esto estará acompañado por la **rotación del viento al sector sur** y que se intensificará de manera temporal. Durante el resto del periodo de pronóstico se espera **estabilidad y buen tiempo** dentro de la zona GEA.

Las temperaturas máximas descenderán a partir del viernes 7 y se mantendrán similares, entre 10 y 14°C, hasta el martes 11. **Hacia el final del periodo de pronóstico se espera un nuevo descenso**, con registros que rondarán los 8 a 11°C.

Las temperaturas mínimas también experimentarán un descenso a partir del viernes 7. Los valores más bajos del periodo se medirán principalmente durante el **lunes 10 de agosto: se esperan que estén -2 y -4°C.**

Lo que pasó con el clima en la última semana en la región núcleo

Importantes tormentas en el este

Entre el jueves 30 de julio y el miércoles 5 de agosto se registraron **precipitaciones en el este** de la zona GEA. Los acumulados oscilaron entre **5 y 60 mm**. El máximo registro del periodo fue de **66 mm** y se midió en **Baradero**, Buenos Aires.

Las temperaturas máximas fueron **elevadas** para la época, entre **22 y 28°C** con los valores más altos en el norte de la zona GEA y los más bajos en el sur. La marca más alta, **28,3°C**, se midió en la localidad de **Bengolea**, en Córdoba.

Las temperaturas mínimas oscilaron entre **5 y 8°C**. Los valores más altos se midieron en el oeste y este de la zona GEA y los más bajos en el centro. El mínimo extremo del periodo **5,6°C**, se midió en la localidad de **Guatimozín**, Santa Fe.

Con este panorama se observa un **aumento del área con reservas en condiciones de escasas a regulares en el centro y oeste** de la zona GEA. **En el sudeste los valores de humedad pasaron de óptimos a excesivos.**

Con las actuales condiciones, en los próximos quince días, se requieren entre **20 y 60 mm** en el centro la zona GEA. En el oeste de se necesitan entre **60 y 80mm** para llevar a valores óptimos la humedad del suelo.

Extensión GEA: O de Córdoba, N de Santa Fe, Santiago del E. y Chaco

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 6 de agosto de 2026 – N° 981 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

La circulación calidad y húmeda se impuso en julio

Las condiciones atmosféricas, en líneas generales, no han presentado variantes demasiado significativas en los últimos siete días. **El flujo polar, instalado en la Patagonia, no ha logrado avanzar** con suficiente consistencia como para vencer **la circulación cálida y húmeda del noreste, que se ha mantenido predominante**. La **densa nubosidad**, al igual que durante gran parte de julio, continuó presente en la totalidad de la región pampeana favoreciendo la **recurrencia de persistentes lloviznas, lluvias débiles, y neblinas matutinas**.

En este monótono entorno la condición más disruptiva de la semana se produjo el **último día de julio**. **Un intenso sistema de baja presión, instalado sobre el este bonaerense, capitalizó en forma de fuertes lluvias el muy alto contenido de humedad transportado desde el noreste del país hacia el centro este de la zona núcleo**.

La presencia de una atmósfera cálida con humedad en exceso, un sistema de baja presión instalado y el avance de aire frío desde el sudoeste, fue una combinación **más que propicia para desencadenar un intenso proceso de ciclogénesis** que provocó: descenso de las temperaturas, fuertes ráfagas de viento y el desarrollo de tormentas intensas con **abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo**.

Los registros fueron muy elevados para la época del año, entre 20 y 100 milímetros, pero acotados al corredor marcado por el recorrido del flujo de aire cálido sobre la **franja este del país**. **Misiones, Corrientes, Entre Ríos, el norte y sudeste de Santa fe, y el este de Buenos Aires** fueron las zonas que recibieron el total de las precipitaciones. El resto del país, del Río Colorado hasta Jujuy, se mantuvo al margen de cualquier aporte de agua

por más necesario que este haya sido, más allá de algunas lloviznas aisladas nada relevantes.

La Patagonia se ubica en otro contexto, con temperaturas bajo cero y nevadas intensas que se mantienen, con alguna intermitencia, desde hace más de veinte días.

En el centro del país el descenso de las temperaturas fue breve, y las precipitaciones intensas, pero muy acotadas en geografía y duración. Promediando el segundo día de agosto las condiciones climáticas **retornaron rápidamente al ambiente gris, cálido y húmedo** que predominó durante el mes de julio.

Las reservas de agua en el suelo no son ajenas al efecto de esta oferta pluvial con **exagerado gradiente positivo sobre el este del país**. La diferencia de humedad en los perfiles comienza a hacerse notoria, aun teniendo en cuenta la desigualdad típica, entre el este y el oeste, que plantea regularmente el periodo invernal.

Por el momento la situación no es de compromiso, y la humedad alcanza para sostener el desarrollo de los cultivos implantados, pero **el oeste mediterráneo comenzará a requerir el auxilio de lluvias durante agosto para llegar con tranquilidad a la primavera**.

Un avance en ese sentido podría concretarse antes de que culmine la primera semana del mes. **Los pronósticos de muy corto plazo muestran el avance de un sistema frontal con condiciones para favorecer el desarrollo de nuevas precipitaciones**. Según los modelos tendrán una estructura similar a las del final de julio, pero con una cobertura geográfica **más extendida hacia el oeste de la zona núcleo**.

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea


FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 6 de agosto de 2026 – N° 981 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO



GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



BCR

DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR