



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 03 de septiembre de 2026 – N° 985 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

“Se ven sembradoras por todos lados, en 10 días se termina todo el maíz”

Lo dicen en Gálvez, López, Cañada Rosquín y El Trébol. Es inédito: ya se sembraron 230.000 ha cuando suele arrancar recién el 10 de setiembre. El norte de la región pisa el acelerador pero, ¿alcanzará el agua? En cambio, el miedo a las bajas temperaturas mantiene en la línea de largada a las sembradoras del sur.

Sin lluvias pero con heladas

Se espera una semana estable con un marcado descenso térmico durante el fin de semana y posibilidad de heladas en el sur de la zona GEA.

“Las reservas de agua están ajustadas en el oeste y los cultivos transitarían los primeros 10 días de septiembre, o más, sin el auxilio de las lluvias”, dice el consultor Elorriaga.

Inédito: ya se implantó el 10% del maíz temprano de la región

Continúa siendo récord la precocidad de esta campaña. Es el mayor progreso registrado al menos de las últimas cinco campañas. **El centro-sur de Santa Fe lidera con un 30%.** En Carlos Pellegrini **ya se sembró el 50%.** “Se ven sembradoras por todos lados, en 10 días se termina todo el maíz”, dicen técnicos de Gálvez, López, Cañada Rosquín y El Trébol. Hacia el sur provincial es otra historia, **prefieren no adelantarse por el riesgo de heladas tardías.** En Bigand, las labores comenzaron esta semana; en San Gregorio solo lo harán algunos productores grandes, el grueso se concentraría entre el 15 y el 20. En el norte bonaerense, como en Pergamino, **ya se ven sembradoras trabajando,** se espera que se generalice durante los **próximos días.** No muy lejos, en Junín, la mayoría en cambio **apuntan al 20 de septiembre:** “las

temperaturas del suelo todavía son justas. **Buscamos evitar una emergencia desuniforme** ante el pronóstico de un nuevo descenso térmico”, aclaran los técnicos. En Corral de Bustos, sudeste de Córdoba, dicen lo mismo y buscan arrancar a mediados de septiembre. A 80 km de allí, en Marcos Juárez, **algunos productores ya comenzaron a sembrar.** Pero advierten: “la humedad superficial está muy ajustada”.

¿Y entonces? ¿Por qué se nota esta diferencia de comportamiento aún en localidades vecinas?

Más allá de que se nota mucho la diferencia de estrategia entre el norte y el sur de la región en el adelantamiento de la siembra maicera, también hay otras variables. Por ejemplo, la logística: si se trata de productores con **grandes superficies o limitaciones de maquinaria** o los que **no tienen necesidad de apresurar excesivamente la fecha de siembra.** También con el adelantamiento o no de la siembra se toma una posición respecto a **si da más temor arriesgar a una emergencia que se estire por falta de temperatura en los suelos o si da más miedo entrar con el período crítico en la última parte de diciembre o más aún en enero.** El comportamiento del maíz del año pasado, tiene mucho que ver con esto porque el agua se cortó en la **última semana de diciembre 2025.** **Y muchos productores que se adelantaron, lograron escaparle a la falta de agua que marcó al cultivo en enero, logrando rindes excelentes.** Enero, siempre enero, es el mes crítico y el más complejo; enero, el mes que aun con un “Niño” siempre da miedo la falta de agua. Y más aún con un enero 2027 con **mayores probabilidades de sufrir olas de calor potenciadas por este súper “Niño” que se espera.**

¿Sembradoras en marcha y semillas que se hacen esperar?

Surgió a principios de semana el rumor de que en algunos lugares la semilla no estaba llegando a tiempo. Pero, ¿qué hay de cierto en esto? Los técnicos son claros y responden

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR




Semana al 03 de septiembre de 2026 – N° 985 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

que la mayor parte de las semillas de maíz fue entregada en tiempo y forma si bien **hay algunos problemas puntuales**. Por ejemplo, en Bigand comentan que **hubo algunas demoras y problemas de calibre pero en determinados híbridos**. En el noreste bonaerense, en Pergamino y Colón señalan que todavía hay pedidos pendientes, **especialmente de los híbridos más demandados**. En Marcos Juárez, **"las entregas de semillas vienen más demoradas que en años anteriores"**, dicen los técnicos.

¿Puede faltar el agua para sembrar maíz?

En Carlos Pellegrini **ya se sembró el 50%** del maíz, pero **la ausencia de lluvias comienza a generar problemas en la disponibilidad de humedad**. "Los lotes que no tienen una rotación adecuada **no tienen reservas suficientes para continuar con la implantación**", advierten. Las lluvias que **lamentablemente estuvieron acompañadas por granizo** dejaron la siguiente distribución de milímetros en la región:




Estos milímetros valen oro para la actividad de siembra maicera porque no hay pronósticos a la vista de nuevas lluvias por lo menos por los próximos 7 días. "El invierno está entrando en su etapa final y el "Niño", ya

formalmente instalado por el elevado calentamiento del Pacífico, no ha ejercido ningún tipo de efecto superador de las precipitaciones sobre la región pampeana", explica el consultor Elorriaga.

¿Granizo en invierno?

El evento de granizo del jueves pasado (24/8), dejó varias preguntas entre técnicos y productores, pero la del título empezó a estar en boca de casi todos. Y si bien hay registros de eventos anteriores en invierno, **es cierto que son fechas poco usuales**. La explicación de Elorriaga es que **"las temperaturas que alcanzaron valores superiores a las habituales** para la época son las que provocaron el importante **contraste térmico**, más allá del repentino **ingreso de aire frío**". La imagen de las temperaturas máximas del día anterior al evento es elocuente.



Justamente, los técnicos de Marcos Juárez destacaban que **"un porcentaje importante (50 %) de los productores aún no habían asegurado, ya que por lo general realizan el seguro en fechas posteriores"**. El evento le ha dado un **golpe significativo** al cultivo en esta área, donde el 50% del trigo estaba en encañazon. **"Cayó granizo en una zona importante, entre Marcos Juárez y Leones hacia el norte. Hay daños en trigos encañados. En el peor de los casos puede alcanzar el 30 a 35 %**. Hay que seguir evaluando y **ver si los macollos secundarios**

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 03 de septiembre de 2026 – N° 985 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

podrían llegar a compensar la pérdida de la planta principal, que en todo caso sería una compensación parcial”, explican. Otra área muy afectada es entre Classon y Colonia Médici, “Los daños aún se encuentran en evaluación, aunque se estiman entre un 10% y un 30%. El principal daño está en la defoliación del canopeo pero también hay daños en el ápice principal. “Estaban muy lindos, excelentes antes del granizo”, agregan.


¿Qué dicen los satélites acerca del daño de granizo de la semana pasada?

En una primera aproximación de hectáreas alcanzadas por el evento de granizo, el jueves pasado se estimaba entre 30.000 y 80.000 ha de trigo. En esta semana, se hizo un análisis con satélites. Pero primero se evaluó un lote en particular que llegó incluso a mostrar cráteres por el impacto del granizo (última imagen). Sin embargo comenzaron dificultades que en verano no hay. Por ejemplo, que en invierno se encuentran lotes cultivados, barbechos y cultivos en distintos estados de desarrollo, con una cobertura verde todavía limitada y presencia de suelo desnudo. En estas condiciones, una pérdida de área foliar moderada o mínima puede no generar una caída evidente del NDVI, especialmente en los primeros días posteriores al evento. Un estudio realizado sobre trigo con Sentinel-2 encontró que la mayor caída del NDVI asociada al granizo se manifiesta aproximadamente 13 días después del evento en trigo (Kumar et al., 2022). En lotes puntuales de la región, incluso donde se constató in situ cerca de un 20% de afectación del área foliar, la imagen disponible inmediatamente después del evento no mostró una anomalía negativa clara. A esto se suma la nubosidad de los días posteriores. Lamentablemente, el análisis de las imágenes satelitales mediante el índice de vegetación NDVI de esta semana no logró poder ajustar el número de hectáreas afectadas con la suficiente certeza. ¿Esto significa que no hay daño significativo? No, que todavía

no aparezca una señal regional de caída del NDVI, no significa que no haya daño.

Evaluación de caída de NDVI pre y post granizo

Lote con daño verificado a campo



Aunque el lote presenta daño por granizo verificado a campo, la información satelital disponible hasta el 30/08/2026 no muestra una caída significativa del NDVI.

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea



FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 03 de septiembre de 2026 – N° 985 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO



GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR




BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 03 de septiembre de 2026 – N° 985 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

SUBZONAS Y RED DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS GEA



SUBZONA I

“No se registraron daños por granizo o fuertes vientos”, dicen los técnicos de **Carlos Pellegrini**. “El evento se produjo a unos 50 kilómetros de la localidad, por lo que ningún cultivo de la zona se vio afectado”, agregan. Respecto al panorama fitosanitario en trigo, por el momento **no se observan daños considerables por enfermedades: “la incidencia continúa siendo baja”**. El cultivo presenta un muy buen estado. Alrededor del 50% del área se encuentra en encañazón y el **50% restante en hoja bandera**. En cuanto al maíz, **la siembra avanza a un ritmo más acelerado** que en otras campañas, **ya alcanzó aproximadamente el 50%** del área prevista. Sin embargo, **la ausencia de lluvias comienza a generar problemas en la disponibilidad de humedad**. “Los lotes que no tienen una rotación adecuada presentan **reservas insuficientes para continuar con la implantación**”, dicen en el área, por lo que en unos días se frenaría la siembra hasta que se produzcan nuevas lluvias, señalan los técnicos. En cuanto a la fertilización, se están realizando aplicaciones con

buena provisión de fertilizantes. Por el momento la entrega de semillas es normal y sin inconvenientes.

“El **granizo tuvo un impacto acotado** en la zona; afectó unos pocos lotes puntuales”, comentan los técnicos de María Susana. “Arrancó en el área de Villa María y avanzó hacia **Bouquet, Las Rosas, San Genaro y Maciel**. En Maciel, el granizo se desgranaba como que no estaba tan compacto”, agregan. Los lotes alcanzados serán evaluados por los inspectores para determinar el porcentaje de afectación. En cuanto a la cobertura, se estima que **alrededor del 90% de los productores cuenta con seguro contra granizo**. Respecto del **trigo**, se encuentra en **encañazón** y presenta una **muy buena condición, incluso superior a la observada en la campaña pasada**. No se registran problemas importantes de enfermedades hasta el momento. Sin embargo, el adelantamiento fenológico mantiene latente el riesgo de **heladas tardías**. “A partir de 15 de este mes al 15 de octubre, de ocurrir una helada puede afectar bastante por lo adelantado que están los trigos”, advierten los ingenieros. Además, señalan que hay que estar atentos a una helada que podría ocurrir este domingo. En el **norte del país**, los trigos se encuentran incluso en etapas más avanzadas, con numerosos lotes ya **espigados**. En cuanto al **maíz temprano**, la siembra avanza con **normalidad** y **sin inconvenientes en la disponibilidad de semillas ni fertilizantes**. Las condiciones de humedad son adecuadas, sin excesos que dificulten las labores, y el avance viene siendo muy bueno. Se estima que **podría finalizar en unos 10 días**.

En la zona comprendida entre **Classon y Colonia Médici**, el jueves pasado se registró **una tormenta con fuertes vientos y abundante granizo**. Los daños aún se encuentran en evaluación, aunque se estiman **entre un 10% y un 30%**. Los lotes de trigo se encuentran en **encañazón** y el **principal efecto observado corresponde a la defoliación del canopeo**, mientras que, en menor

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 03 de septiembre de 2026 – N° 985 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

medida, también se registraron daños en el ápice principal. "Estaban muy lindos, excelentes hasta antes del granizo, sin enfermedades. Hay algo de presencia de mancha amarilla en la zona pero **no se observa roya** hasta el momento", señalan los asesores de la zona. Respecto al maíz, comenzaron las labores de **incorporación de urea** y preparación de los lotes, aunque se espera que la siembra se inicie recién dentro de aproximadamente **una semana**.

SUBZONA II

En **Bigand**, **no se registraron daños** por granizo ni por fuertes ráfagas de viento en los lotes de la zona. En cuanto a la cobertura de seguros por este tipo de eventos, los técnicos estiman que **"más del 80% de los lotes cuenta con seguro contra granizo, y en algunos casos se incorporan coberturas adicionales frente a heladas y otros eventos climáticos"**. Respecto del trigo, las bajas temperaturas y heladas generaron **daños visibles**. Pero hay diferencias según **la sensibilidad de cada variedad**. Continúa observándose presencia de **mancha amarilla**, que en algunos casos puede confundirse con el amarillamiento provocado por las heladas. Hasta el momento se realizaron aplicaciones con fungicidas en **muy pocos lotes**. También se detectan sectores con amarillamiento asociado a **bajas dosis de nitrógeno**. El cultivo se encuentra dividido entre pleno macollaje y encañazón. En cuanto a la condición, **un 20% de los lotes presenta condición excelente, 60% muy buena** y 10% buena. En cuanto al maíz, la siembra todavía **no comenzó** en la zona. El inicio sería inminente, **"en esta semana"**, señalan. En materia de fertilización, ya se incorporó urea en algunos lotes, aunque representa todavía una proporción baja del área total. La disponibilidad de semillas es heterogénea: mientras algunos materiales fueron entregados en tiempo y forma y presentan calibres adecuados, en otros casos hay **demoras** en las entregas y mayores **dificultades con los calibres**. De todos modos,

la mayoría de los productores no manifiesta problemas de disponibilidad ni faltantes de semilla.

En la zona de **Bombal** se registró **algo de granizo** la semana pasada. **El evento fue de baja intensidad y no provocó daños** en los lotes de trigo ni en las pasturas. Respecto del estado sanitario del trigo, solo se registra baja presencia de **mancha amarilla**, cuya evolución está siendo lenta y, hasta el momento, no representa una amenaza significativa para el cultivo. El trigo presenta una condición fisiológica **excelente en el 100%** del área. En cuanto al desarrollo fenológico, el 95% de la superficie se encuentra en pleno macollaje, mientras que el **5% ya ingresó en encañazón**.

En el área de **San Gregorio**, los cultivos de trigo transitan desde **pleno macollaje hasta Z32**, según la duración de los ciclos: "los ciclos largos e intermedios están en Z32, con **dos nudos encañados**, y los más atrasados, que son los cortos, están en pleno macollaje", señaló un referente local. En cuanto a la sanidad, se detectó **roya estriada** de manera muy puntual, por lo que hasta el momento las aplicaciones de fungicidas fueron limitadas. "Aplicamos recién el primer lote la semana pasada, fue una situación muy puntual de roya estriada", explicó. En contraste, la **mancha amarilla** aparece de manera generalizada, con lotes que presentan entre **5% y 25% de incidencia**, aunque por ahora sin necesidad de realizar aplicaciones específicas, salvo algunos casos puntuales, principalmente en lotes con trigo sobre trigo. "Todos los lotes en general vienen con mancha amarilla, como dato curioso respecto a otras campañas", indicó. El escenario sanitario es seguido de cerca ante la posibilidad de un **incremento de las enfermedades durante las próximas semanas y el avance del cultivo hacia hoja bandera**. Respecto del maíz, la **siembra todavía no comenzó en la zona**. Los primeros lotes de semillero se prevén para los **primeros días de septiembre**, mientras que el grueso de la implantación se concentraría entre el **15 y el 20 de**

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 03 de septiembre de 2026 – N° 985 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

septiembre. “No hay una tendencia a adelantar la fecha de siembra”, remarcaron, principalmente por el riesgo de heladas tardías. A esto se suma una situación de **humedad** que comienza a ser **más ajustada**: “Las últimas lluvias nos esquivaron y ahora ya estamos esperando unos **20 milímetros para los trigos y para la siembra**”. En cuanto al granizo, San Gregorio no registró afectaciones por el evento reciente. “En la zona nuestra, gracias a Dios, no cayó granizo; prácticamente no llovió, llovió **2 milímetros**, así que acá, cero”, señaló el referente, quien indicó que el fenómeno habría afectado una franja más localizada hacia otros sectores de la región.

SUBZONA III

“Por suerte no afectó a la zona norte de Buenos Aires ni el extremo sur de Santa Fe”, dicen con alivio en **Pergamino**. “Creería que en ese estado, el trigo se recupera, pero es fundamental la evaluación de cada lote. Por suerte no afectó la región donde trabajo”, agregan los técnicos. En el área, **el 80% del trigo ya está en encañazon**, el resto en macollaje. Respecto a la condición el **80% se mantiene en condiciones excelentes a muy buenas**. El resto está bueno. Respecto a la siembra maicera, “en Pergamino, Colón y el extremo sur de Santa Fe no se comienza hasta entrado septiembre. Esta semana estimamos ver **alguna sembradora trabajando**”, la siguiente se irá generalizando la siembra”, responden los técnicos. Mientras tanto, en varios casos se está incorporando urea. ¿Problema disponibilidad o entrega de semillas? “**Hay muchos pendientes, sobre todo en los híbridos más demandados**”, responden.

SUBZONA IV

En la zona de **Junín**, el reciente evento de tormentas **no generó daños** por granizo. “Las precipitaciones fueron **muy desparejas**, con sectores que prácticamente no recibieron lluvias y otros que acumularon **15 a 20 mm**”. El

cultivo de trigo presenta una **buena condición sanitaria y avanza favorablemente**. “la mayoría de los lotes se encuentran en estado de **encañazon**, especialmente los materiales de ciclo largo. Si bien se observan algunas **manchas puntuales**, vienen bien en términos generales. Además, ya se completó prácticamente en todos los casos el **refuerzo de la fertilización nitrogenada**”, explican. Respecto al maíz temprano, algunos productores **comenzaron o evalúan iniciar la siembra hacia el 10 de septiembre**. Sin embargo, la mayoría se ha planificado más para el 20”, indican los técnicos y agregan “la temperatura del suelo no se acomoda todavía, y ante el pronóstico de un nuevo descenso la semana próxima, el objetivo es evitar implantaciones con bajas temperaturas, que pueden dificultar y desuniformar la emergencia del cultivo. “**Creemos que vamos a tener un septiembre que nos va a dejar sembrar**”, sostienen, por lo que consideran que, salvo en planteos con grandes superficies o limitaciones logísticas, **no habría necesidad de apresurar excesivamente la fecha de siembra**.

SUBZONA V

“Cayó granizo en una zona importante la semana pasada. Fue entre **Marcos Juárez y Leones hacia el norte**. Hay daños en trigos encañados que estamos analizando y cuantificando. **En el peor de los casos puede alcanzar el 30 a 35 %**”, dicen los técnicos de **Marcos Juárez**. “De todas formas hay que seguir evaluando y **ver si los macollos secundarios podrían llegar a compensar la pérdida de la planta principal, que en todo caso sería una compensación parcial**”. Respecto a la cobertura de seguros, explican en el área que “**un porcentaje importante (50 %) de los productores aún no habían asegurado, ya que por lo general realizan el seguro en fechas posteriores**”. El evento le ha dado un **golpe significativo** al cultivo en el área. **Ya el 50% del área estaba en encañazon**, el resto en macollaje. Con respecto al tema enfermedades, “tenemos bastante

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 03 de septiembre de 2026 – N° 985 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

incidencia de **mancha amarilla**", advierten. "Se observa con **severidades moderadas**. Seguramente, requerirán tratamiento con **funguicidas**". La condición del cultivo se actualiza ahora con un 65% muy bueno a excelente, bueno un 20% y regular el 15%. **Comenzó la siembra de maíz** en la zona: "**es un pequeño porcentaje, se tratan de productores con mucha superficie de trabajo**. La humedad superficial está **ajustada**". Muchos lotes ya tienen una parte del nitrógeno incorporado antes de la siembra. Respecto a la disponibilidad de disponibilidad o entrega de semillas viene atrasada con respecto a otros años. El avance de la siembra es del **5%** en el área.

En la zona de **Corral de Bustos**, no hubo tormenta de granizo la semana pasada. "Acá fue bastante **liviano**, tranquila, gracias a Dios. **Daño no se ve nada en los cultivos**", señalan los asesores. "Los trigos presentan una **muy buena condición** general y se encuentran comenzando la etapa de **encañazón**, con el primer nudo ubicado aproximadamente a 2-3 cm del suelo". En maíz, durante la última semana en la zona se avanzó con algunas **aplicaciones de urea**. Todavía no se inició la siembra. "**Estamos con idea de esperar tranquilos mitad de mes**", explican los técnicos, quienes destacan que la estrategia es aguardar mejores condiciones térmicas y sembrar con el suelo más caliente. "Los productores con los que trabajamos pueden completar la siembra en **pocos días**, por lo que no se considera necesario anticipar demasiado la fecha de implantación".

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 03 de septiembre de 2026 – N° 985 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

INDICADORES CLIMÁTICOS

Lo que viene, el pronóstico para la semana próxima en la región núcleo

Sin lluvias pero con heladas

El periodo comprendido entre el **jueves 3 y el miércoles 9 de septiembre** comienza con un mejoramiento de las condiciones meteorológicas que se mantendrán **estables** hasta el final del periodo de pronóstico.

Las **temperaturas máximas** descenderán a partir del **sábado 5**, alcanzando los valores más bajos de la semana el **domingo 6**. Posteriormente los registros ascenderán paulatinamente hasta alcanzar los valores más elevados, entre **20 y 24°C**, el **miércoles 9**.

Las **temperaturas mínimas** también experimentarán un descenso que se acentuará a partir del **domingo 6**, principalmente en el sur de la zona GEA donde se estiman valores entre **0 y -2°C**, en el resto de región las mínimas serán algo superiores. Esta irrupción de **aire frío** perdurará hasta **martes 8**, luego los valores ascenderán lentamente.

Lo que pasó con el clima en la última semana en la región núcleo

Semana con algunas lluvias y con amplio rango de temperaturas en la región

La semana comprendida entre el **jueves 20 y el miércoles 26 de agosto** se registraron algunas precipitaciones en la zona GEA. Los acumulados rondaron los **6 a 14 mm** y se concentraron en el **norte de la zona GEA**. En el resto de la región los registros variaron entre **cero y 5 mm**. El máximo acumulado del periodo fue de **14 mm** y se midió en **Clason, Santa Fe**.

Las **temperaturas máximas** variaron entre **22 y 26°C**, con los valores más altos en el norte de la zona GEA y los más bajos en el sudeste/sur. La marca más alta, **26,3°C**, se midió en la localidad de **Pozo del Molle**, en Córdoba. Las **temperaturas mínimas** oscilaron entre **-1 y 7°C**, los valores más altos se midieron en el noreste de la zona GEA y los más bajos en la franja oeste y sur. El mínimo extremo del periodo **-0,2°C**, se midió en la localidad de **Idiazabal**, en Córdoba.

Con este panorama las reservas se mantienen de **escasas a regulares** en el **centro/oeste de la zona GEA**, aunque el área de escasez disminuyó respecto de la semana pasada. En el **sudeste** los valores de humedad se mantuvieron entre **regulares y adecuados**.

Con las actuales condiciones, en los próximos quince días, se requieren entre **20 y 60 mm** en el **centro de la zona GEA**. En el **oeste** el requerimiento aumentó levemente respecto del informe anterior, ya que actualmente se necesitan entre **80 y 110 mm** para llevar la humedad del suelo a valores **óptimos**.

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS


Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR



Semana al 03 de septiembre de 2026 – N° 985 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO



Extensión GEA: O de Córdoba, N de Santa Fe, Santiago del E. y Chaco

Lluvias escasas y reservas en retroceso hacia el oeste

El cambio de mes se produjo sin demasiadas alteraciones de la dinámica atmosférica que presentó la etapa final de agosto. La única excepción a ese comportamiento fue el **temporal de viento y granizo** que afectó localidades del **centro de Santa Fe y del centro este Cordobés**.

El importante **contraste térmico**, entre temperaturas que alcanzaron **valores superiores a las habituales** para la época y un repentino **ingreso de aire frío**, provocó fuertes **tormentas de viento y hielo**, que no estuvieron acompañadas en su severidad por acumulados de agua demasiado significativos. En la zona los registros semanales se ubicaron en el rango de **2 a 15 milímetros**, bastante normales para la época y poco representativos de la magnitud del evento.

El resto de la región pampeana prácticamente no recibió precipitaciones salvo el **centro norte de Entre Ríos**,

también afectado por el desplazamiento del mismo sistema frontal, aunque con montos levemente superiores, entre **15 y 20 milímetros**.

En otro contexto, y afectado por condiciones atmosféricas diferentes, el **extremo norte de la Mesopotamia** continúa recibiendo volúmenes importantes de lluvia, principalmente el **norte de Corrientes y Misiones**. Esta vez entre **50 y 90 milímetros**, algo que se viene reiterando con frecuencia durante los últimos treinta días y que ubica a esa región muy lejos de la realidad que vive la zona núcleo.

El trimestre frío, incluso su tramo final, normalmente presenta una configuración diferencial de las lluvias entre el este y el oeste. Este año no es distinto y también está provocando un fuerte contraste entre ambas franjas de la región pampeana, aunque con precipitaciones que se mantienen muy **modestas sobre el este** y prácticamente **nulas sobre el oeste**.

La diferencia no es solo pluvial, los suelos de ambas regiones presentan condiciones que reflejan esa disparidad. **El norte y este de Santa Fe, Entre Ríos, y la mayor parte de Buenos Aires**, mantienen reservas entre **adecuadas y óptimas**, pero el escenario cambia bastante a medida que avanzamos hacia el oeste. El **sudoeste santafecino, Córdoba, el oeste bonaerense y La Pampa** ya dan indicios de **escasez de agua en el suelo**, por lo menos en la **capa superficial**.

Si bien los cultivos de la fina en el oeste todavía satisfacen sus requerimientos hídricos comienzan un periodo de alta demanda y, muy probablemente, deberán transitar la **primera década de septiembre**, o más, **sin el auxilio de las lluvias**.

El invierno está entrando en su etapa final y el **NIÑO**, ya formalmente instalado por el **elevado calentamiento del**

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR




BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 03 de septiembre de 2026 – N° 985 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

Pacífico, no ha ejercido ningún tipo de efecto superador de las precipitaciones sobre la región pampeana en general, ni sobre la zona núcleo en particular.



GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR