



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 17 de septiembre de 2026 – N° 987 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

El trigo empieza a sentir la falta de agua: 160.000 ha están en condición regular

Por Marina Barletta, Florencia Poeta y Cristián Russo

Con el trigo acercándose a su período crítico en la región núcleo, crece la necesidad de lluvias para evitar un mayor deterioro y sostener el potencial de rinde. El maíz lleva casi un 40% de avance, aunque la siembra empieza a demorarse por la falta de humedad.


Probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas para el domingo

Las temperaturas máximas y mínimas experimentarán un ascenso durante los próximos días, alcanzando sus mayores valores entre el sábado y domingo. Posteriormente, se prevé un descenso asociado al ingreso de aire frío, seguido de un nuevo ascenso de las temperaturas.

“Los modelos de pronóstico de corto plazo prevén un aumento de las temperaturas, seguido por el avance de un frente frío y precipitaciones que, por el momento, se anticipan como poco generalizadas y de moderado volumen.”, dice el consultor Elorriaga.

En trigo hay 160.000 ha en condiciones regulares por la falta de agua


En lo que va de septiembre, la **región núcleo** lleva **acumulados** registros entre **5 y 35 milímetros**, cuando los valores normales **históricos mensuales** oscilan entre los **30 y 70 milímetros**, con un gradiente que asciende de oeste a este. Y las **reservas de agua** presentan un **retroceso** que se extiende con cada día que pasa.



Por la falta de agua, ya hay **160.000 ha de trigo en condiciones regulares**; esto es, el **10% del cultivo de la región**. Esto contrasta con las **55.000 ha** que el año pasado se encontraban en esas condiciones, pero por **excesos de agua**. En este ciclo también hay un **25%** de los cuadros **buenos**, un **50% muy bueno** y un **15% excelente**.



Condición de Trigo en Región Núcleo



GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 17 de septiembre de 2026 – N° 987 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

La **demanda de agua** se hace cada vez más **importante** para el trigo, que está muy cerca de entrar en el **período crítico**. Hay un puñado de lotes en el **sudeste de Córdoba** y **centro sur de Santa Fe** que ya están con la **espiga embuchada** (1% de los lotes de la región). El **5%** está **desplegando la hoja bandera**, un **52%** está **encañando** y el **42%** sigue en **macollaje**.

El déficit hídrico empieza a mostrar los síntomas y las heladas suman presión


La **falta de agua empieza a dejar señales** visibles en los cultivos, a las que en algunos sectores se suman los efectos de las heladas. En **Marcos Juárez**, el déficit hídrico se manifiesta con **amarillamiento de plantas**, mientras que en **Carlos Pellegrini** se observan **síntomas en las hojas inferiores** asociados a una **menor absorción de nitrógeno**. Más **hacia el sur**, las **heladas** comienzan a dejar daños concretos: en **Bigand**, los técnicos advierten que las últimas heladas dejaron **daños foliares de distinta intensidad**, que varían **según la variedad y el nivel de fertilización**: “mejor fertilizado, menos daño”. En **General Villegas**, los trigos más adelantados aparecen “bastante golpeados”, con algunas **hojas bandera quemadas**. Y en **María Susana**, donde el cultivo ingresa en los inicios de espigazón, advierten que, a partir de ahora, tanto la **falta de lluvias** como las **heladas tardías** empiezan a modificar el **potencial de rendimiento**.

A poco de empezar el periodo crítico del trigo, las enfermedades se mantienen a raya

Las enfermedades, como **mancha amarilla**, están **contenidas** en la región. En Marcos Juárez, las bajas temperaturas **ralentizaron la evolución de la mancha amarilla**, aunque la enfermedad continúa presente. Durante estos días se prevén **aplicaciones de fungicidas** en la mayoría de los lotes, con el objetivo de **proteger la hoja bandera**. En Carlos Pellegrini, Las enfermedades permanecen contenidas en las **hojas inferiores**. San Pedro y Baradero, se están haciendo **controles para tratarlas**.

Maíz 26/27: ya se sembraron casi 1 M ha, pero la falta de humedad comienza a frenar el avance

La siembra de maíz ya cubre **970.000 hectáreas** en la región, cerca del **40% del área** intencionada, luego de sumar unas **470.000 hectáreas** en apenas siete días. El avance, sin embargo, encuentra **límites en la disponibilidad de humedad**. En algunos sectores se esperaba contar con mejores temperaturas para iniciar las labores, pero ahora el problema pasa por la **falta de agua para continuar**. En **General Villegas**, por ejemplo, el movimiento de máquinas recién comenzó esta semana y la humedad está al límite: “los lotes provenientes de trigo y soja de 2da están con humedad, aunque no les sobra nada, mientras que en los **lotes con rastrojos de soja de primera** son muy pocos los que hoy se pueden sembrar ya que la **humedad es escasa**”. Allí el **avance** apenas llega al **5%**, convirtiéndose en el sector más retrasado de la región, mientras que en el extremo opuesto, el **norte regional alcanza el 85%**. En los alrededores de **Carlos Pellegrini**, la siembra ya **finalizó**, mientras que en **Cañada de Gómez** esperan un chaparrón para poder continuar: “para retomar las labores sobre se necesitan algunos milímetros que permita recomponer la humedad superficial”.



GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 17 de septiembre de 2026 – N° 987 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

El frío demora la emergencia del maíz: los nacimientos se extienden a más de 15 días

Mientras la falta de humedad comienza a limitar el avance de la siembra, las **bajas temperaturas condicionan el ritmo de emergencia** de los lotes ya implantados. En **María Susana y alrededores**, donde la siembra ya finalizó, los nacimientos avanzan muy lento: **"el 90% todavía no emergió; solo los sembrados entre el 20 y el 25 de agosto emergieron"**. La situación también se repite en **Marcos Juárez**, donde los primeros lotes recién comienzan a mostrar las primeras plántulas y **las demoras en la emergencia alcanzan los 15 días**. Hacia **San Pedro y Baradero**, los técnicos también advierten sobre el impacto de las bajas temperaturas: **"todavía estamos bastante lejos como para tener una buena emergencia"**. El repunte de las temperaturas previsto para esta semana podría acelerar los nacimientos, aunque plantea un nuevo desafío en los lotes que aún cuentan con reservas ajustadas".

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
BCR

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea



FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 17 de septiembre de 2026 – N° 987 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO



GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
BCR

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR




BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 17 de septiembre de 2026 – N° 987 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

SUBZONAS Y RED DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS GEA



SUBZONA I

En **Carlos Pellegrini**, la siembra de maíz avanza con buenas emergencias, aunque bajo un escenario de humedad cada vez más ajustada: “si bien los lotes de maíz sembrados han germinado muy bien, hay que tener en cuenta que se han sembrado con humedades muy ajustadas y, esto sumado a las temperaturas bajas, hace que las emergencias estén siendo muy lentas”, señalan los técnicos. La humedad de los primeros centímetros del suelo descendió considerablemente y, por eso, los técnicos no recomiendan continuar con las siembras en estas condiciones. Sin embargo, algunos productores, ante la falta de pronósticos de lluvia para los próximos días, están optando por sembrar a mayor profundidad para encontrar mejores condiciones de humedad. En trigo, el 10% de los lotes transita pleno macollaje y el resto se encuentra en encañazón. Las bajas temperaturas no están generando daños por heladas, aunque comienza a evidenciarse el impacto de la falta de agua: “se observan síntomas en las hojas inferiores asociados también a una menor absorción de nitrógeno por la escasez de

humedad”. Los técnicos estiman que los cultivos podrían sostener esta situación hasta fines de septiembre, siempre que no se combine la falta de lluvias con un período prolongado de temperaturas elevadas. Las enfermedades permanecen contenidas en las hojas inferiores. A pesar de las limitantes que se, el 100% de los cuadros se mantiene en muy buenas condiciones.

En **María Susana y alrededores**, los trigos se mantienen en buenas condiciones, aunque crece la preocupación por la falta de agua y las heladas tardías. “El cultivo ingresa en los inicios de espigazón, una etapa crítica en la que tanto la falta de lluvias como las heladas tardías pueden modificar el potencial alcanzado”, advierten los técnicos. Sin embargo, los lotes bien rotados y fertilizados todavía conservan un muy buen potencial; “de producirse en pocos días aunque sea un pequeño aguacero, tienen perspectivas de muy buen rendimiento, mayor a 50 qq”. En los planteos con menor inversión tecnológica, en cambio, ya comienza a evidenciarse esa diferencia, aunque el piso de rendimiento se ubica actualmente en torno a los 40 qq/ha. Por el momento, la incidencia de enfermedades es baja. En maíz, la siembra ya está completa, pero la emergencia avanza muy lentamente: “el 90% todavía no emergió; solo los sembrados entre el 20 y el 25 de agosto emergieron”. La principal limitante está en la superficie del suelo, donde prácticamente no queda humedad, mientras que en profundidad las reservas todavía son buenas.

En **Cañada de Gómez**, la siembra de maíz alcanza el 70% de la superficie prevista. Los primeros lotes implantados todavía no emergieron. Hasta el momento se avanzó sobre los lotes que contaban con humedad suficiente para asegurar el nacimiento, mientras que para retomar las labores sobre la superficie restante se necesita un chaparrón que permita recomponer la humedad superficial.

En trigo, las bajas temperaturas no generan preocupación por el momento y no se observan daños por heladas. Sin

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR



Semana al 17 de septiembre de 2026 – N° 987 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

embargo, comienza a percibirse una disminución de las reservas de agua, especialmente en los lotes con menor nivel de fertilización. Aun sin lluvias, estiman que los cultivos podrían sostenerse en buenas condiciones hasta octubre. La condición general del trigo es buena y, por ahora, no se observa presencia de enfermedades. Si bien se adquirieron fungicidas de alta tecnología ante la expectativa de un escenario climático de Niño, hasta el momento no ha sido necesario aplicarlos.

SUBZONA II

En **Bigand**, la siembra de maíz alcanza un 60% de avance, aunque todavía no hay lotes emergidos. "Los primeros lotes sembrados presentan una demora en la emergencia por el frío ambiental y de suelo, que genera lentitud en el avance de la germinación", explican los técnicos. "La humedad disponible permite avanzar principalmente sobre lotes con antecesor trigo/soja, mientras que los de soja de primera presentan mayores dificultades por la escasa humedad superficial", agregan. En trigo, las últimas heladas dejaron daños foliares de distinta intensidad, que varían según la variedad y el nivel de fertilización: "mejor fertilizado, menos daño", señalan. A su vez, la distribución irregular de las lluvias comienza a marcar diferencias en el estado de los cultivos. "Consideramos que, de cumplirse la lluvia del 21/09, los trigos tendrían su producción normal", estiman los técnicos. En cuanto a la sanidad, se observa presencia de mancha amarilla, con algunos lotes que ya fueron controlados. Actualmente, el 10% de los cuadros se encuentra en condición excelente, el 40% muy buena y el 50% buena, todos en encañazón.

En **Bombal**, la siembra de maíz alcanza el 30% de la superficie prevista. Las reservas de humedad son buenas y permiten continuar con las labores, aunque la principal preocupación está puesta en las bajas temperaturas del suelo, que podrían demorar la emergencia. Hasta el

momento, los primeros lotes sembrados todavía no presentan nacimientos.

En trigo, el cultivo mantiene una condición fisiológica excelente. El 80% de los lotes se encuentra en foliación, mientras que el 20% restante corresponde a etapas posteriores de desarrollo.

SUBZONA III

En **San Pedro y Baradero**, los cultivos de fina mantienen una condición general favorable, aunque comienzan a sentir el impacto de las bajas temperaturas y la falta de lluvias. "Los trigos están con algunas enfermedades fúngicas que se están controlando", señalan los técnicos, mientras que las últimas heladas también dejaron su marca en los lotes. La arveja atraviesa una situación similar. A esto se suma un perfil de humedad que empieza a quedar corto: "están con lo justo", describen, y advierten un chaparrón sería bienvenido para sostener los cultivos. En maíz, esta campaña muchos productores adelantaron la siembra, pese a que históricamente predomina el planteo tardío en la zona. Sin embargo, las bajas temperaturas generan preocupación por la emergencia: "todavía bastante lejos como para tener una buena emergencia", explican.

SUBZONA IV

En **General Villegas**, la siembra de maíz comenzó a tomar ritmo esta semana, aunque el avance todavía es muy limitado. Sin embargo los técnicos advierten que la disponibilidad de humedad es limitada en algunos sectores: "los lotes provenientes de trigo y soja de 2da están con humedad, aunque no les sobra nada, mientras que en los lotes con rastrojos de soja de primera son muy pocos los que hoy se pueden sembrar ya que la humedad es escasa". En cuanto al trigo, las heladas de la primera semana de septiembre habrían generado daños puntuales, especialmente en los lotes más adelantados. "Hay algunos

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 17 de septiembre de 2026 – N° 987 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

trigos más adelantados que se sembraron más temprano, que se ven bastante golpeados”, describen los técnicos y agregan que se observan algunas hojas bandera quemada. Si bien todavía resta recorrer los lotes para dimensionar el impacto, consideran que el daño no sería generalizado pero si en algunos lotes sería crítico.

SUBZONA V

En **Marcos Juárez**, la siembra de maíz alcanza aproximadamente el 35% de la superficie prevista, aunque en estos momentos se encuentra prácticamente detenida por la falta de humedad superficial. Las bajas temperaturas también están condicionando la implantación: los primeros lotes recién comienzan a mostrar las primeras plántulas, luego de demoras de más de 15 días en la emergencia.

En trigo, la falta de humedad comienza a sentirse en numerosos lotes, con sectores que muestran amarillamiento de plantas, especialmente donde el déficit es más marcado. El cultivo se aproxima a la etapa de espigazón y necesita nuevas lluvias para sostener el potencial de rendimiento. El 65% del área se encuentra en encañazón, el 30% en hoja bandera y el 5% en espiga embuchada.

Las bajas temperaturas también ralentizaron la evolución de la mancha amarilla, aunque la enfermedad continúa presente. Durante estos días se prevén aplicaciones de fungicidas en la mayoría de los lotes, principalmente con el objetivo de proteger la hoja bandera. La condición fisiológica se distribuye en 40% muy buena, 40% buena y 20% regular.

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 17 de septiembre de 2026 – N° 987 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

INDICADORES CLIMÁTICOS

Lo que viene, el pronóstico para la semana próxima en la región núcleo

Probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas para el domingo

El periodo comprendido **entre el jueves 17 y el miércoles 23 de septiembre** comienza con buenas condiciones meteorológicas que **se mantendrán hasta la mañana del domingo 20**, cuando se espera el pasaje de un sistema frontal frío provocando **chaparrones y tormentas aisladas**. **Este sistema dejará de afectar a la zona GEA durante la madrugada del lunes 21**, acompañado por la intensificación, en forma temporal, y rotación del viento al sector Sur. Posteriormente se esperan buenas condiciones meteorológicas hasta el final del periodo de pronóstico.

Las **temperaturas máximas** ascenderán paulatinamente alcanzando los valores más altos, **entre 28 y 30°C, el sábado 19**. Debido a una nueva irrupción de aire frío los **registros descenderán entre el lunes y martes**, aunque se espera un nuevo ascenso a partir del miércoles 23.

Las **temperaturas mínimas** también experimentarán un **descenso significativo a partir de lunes 21 de septiembre**, alcanzando los valores más bajos del periodo, entre 3 y 8°C, el martes 22. **Al igual que las máximas las marcas mínimas volverán a ascender** en el final del periodo.

Lo que pasó con el clima en la última semana en la región núcleo

Lluvias en el oeste de GEA

La semana comprendida **entre el jueves 10 y el miércoles 16 de septiembre** se registraron **precipitaciones en el oeste** de la zona GEA, donde los valores rondaron los **10 a 30 mm** en forma generalizada. En el **sector sudeste** una **zona de lluvias cuasi-estáticas** provocó que la estación

Junin, en Buenos Aires, registre el **máximo acumulado** del periodo, **39,4 mm**, un valor muy significativo respecto del entorno.

Las **temperaturas máximas** variaron **entre 22 y 28°C**, con los valores más altos en el noreste de la zona GEA y los más bajos en el sudeste y oeste. **La marca más alta, 27,9°C**, se midió en la localidad de **Irigoyen, en Santa Fe**.

Las **temperaturas mínimas** oscilaron entre **-4 y 3°C**, los valores más altos se midieron en el noreste de la zona GEA y los más bajos en la franja oeste y sur. **El mínimo extremo del periodo -3,7°C**, se midió en la localidad de **Gral Pinto, en Buenos Aires**.

Con este panorama **las reservas continuaron disminuyendo levemente respecto de la semana pasada**. El sector con condiciones escasas a regulares que **abarca el centro/oeste de la zona GEA** mantuvo su extensión, pero las áreas con núcleos en condiciones de sequía aumentaron. En el sudeste los sectores con condiciones adecuadas también se redujeron respecto a la semana pasada.

Con las **actuales condiciones, en los próximos quince días, se requieren entre 80 y 110 mm en el centro y oeste de la zona GEA**, mientras que en el **sudeste los valores necesarios para llevar la humedad del suelo a valores óptimos oscilan entre los 40 a 80 mm**.

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea


FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 17 de septiembre de 2026 – N° 987 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO



Extensión GEA: O de Córdoba, N de Santa Fe, Santiago del E. y Chaco

Chaparrones y tormentas puntuales sobre parte de la región pampeana

En los últimos siete días precipitaciones en forma de **chaparrones y tormentas puntuales**, con una distribución muy heterogénea, se desarrollaron sobre **parte de la región pampeana y la Mesopotamia**.

El **oeste de Córdoba, San Luis y parte de La Rioja** recibieron los **acumulados más significativos**, entre **15 y 45 milímetros**, registros que fueron compartidos por Misiones y el norte de Corrientes, en este caso, en el extremo noreste del país.

Lamentablemente **la región núcleo, sector que actualmente más necesita de un generoso aporte pluvial**, promedió valores muy por debajo, entre 0 y 7 milímetros, con alguna excepción puntual bastante superior en el norte de Buenos Aires. **Superada la mitad de septiembre la región pampeana acumula**, en promedio, registros entre **5 y 35 milímetros**. Estos valores,

aun faltando una quincena, parecen bastante alejados de los normales **históricos mensuales** que oscilan entre los **30 y 70 milímetros**, con un gradiente que asciende de oeste a este.

Las precipitaciones se han mantenido esquivas durante la primera quincena del mes, y **las reservas de agua presentan un retroceso** que se extiende con cada día que pasa. Los cultivos implantados todavía mantienen su desarrollo pero claramente comienza a sentirse el desecamiento superficial, que también es una limitante para nuevas implantaciones. Que la situación no sea más comprometida se debe, en gran parte, al límite que los ingresos alternados de aire frío le han puesto al requerimiento atmosférico. Las bajas temperaturas, derivadas del avance de aire frío del sur, aun sin ser extremas condicionan el paulatino e inexorable tránsito a un ambiente más primaveral y, por consiguiente, a temperaturas más elevadas que potencian la transferencia de agua del suelo a la atmósfera.

Los modelos de pronóstico de corto plazo prevén un aumento de las temperaturas, seguido por el **avance de un frente frío y precipitaciones coincidentes con el cambio de estación** que, por el momento, se anticipan como **poco generalizadas y de moderado volumen**. La expectativa de que la primavera arranque con bajas temperaturas y estabilidad agrega un manto de duda sobre la posibilidad de que la segunda mitad de septiembre logre sumar lluvias que acerquen los acumulados mensuales a los valores medios históricos de precipitación.

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea


FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 17 de septiembre de 2026 – N° 987 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO



GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



BCR

DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR