



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 24 de septiembre de 2026 – N° 988 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

La primavera comienza con el 70% de la región núcleo entre escasez y sequía

Por Marina Barletta, Florencia Poeta y Cristián Russo


Las últimas lluvias del invierno no alcanzaron para revertir el déficit hídrico en el centro-oeste de la región. El trigo pierde condición y el maíz encuentra dificultades para avanzar con la siembra. La soja todavía espera hasta octubre, pero ya comenzaron los preparativos con la calidad de la semilla como interrogante.

Domingo y lunes con lluvias aisladas en la región

En la mañana del domingo 27 se espera el pasaje de un sistema frontal frío que provocará chaparrones y tormentas aisladas, con mejoramientos temporarios. Este sistema dejará de afectar la región durante la madrugada del martes 29.

“Una mayor disponibilidad de agua llegaría durante octubre, cuando finalmente los efectos del importante calentamiento del Pacífico Ecuatorial Central comienzan a ejercer su influencia potenciadora de las precipitaciones sobre el centro del país.”, dice el consultor Elorriaga.


Comienza la primavera con el 70% de la región pidiendo agua



Las últimas lluvias del invierno dejaron apenas los milímetros necesarios para que el acumulado del trimestre frío alcance los valores medios en el suroeste de la región núcleo. Sin embargo en el resto del área, los registros quedaron por debajo de los valores históricos.

Para el período junio-agosto, el promedio de los últimos 30 años oscila entre 50 y 150 mm, pero este año los mayores acumulados se concentraron en el noreste bonaerense. Ramallo registró el máximo, con 160 mm, y fue la única estación que alcanzó la media histórica. También se destacaron Baradero y Pergamino, con 129 mm (según datos de la red de estaciones meteorológica de BCR-GEA).

La contracara estuvo en el noroeste regional: Noetinger y Pozo del Molle apenas acumularon 12 mm, mientras que Carlos Pellegrini recibió 25 mm. Este marcado gradiente de lluvias ya se refleja en las reservas de los suelos. Actualmente, el 70% de la Región Núcleo se encuentra entre condiciones de escasez hídrica y sequía, mientras que las reservas regulares se concentran en el noreste bonaerense. Así, la primavera comienza con una disponibilidad de agua limitada y con buena parte del oeste de la región necesitando lluvias inminentes para recomponer las reservas.



El trigo todavía tiene potencial, pero necesita agua para no resignar rinde

El fin de semana dejó algunos milímetros, aunque concentrados en el sudeste de la región núcleo, la zona que hasta ahora aparece menos comprometida por la falta de agua. En el resto de la región, las lluvias fueron prácticamente nulas. Con este escenario, los lotes en

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR




Semana al 24 de septiembre de 2026 – N° 988 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

condición excelente retrocedieron 7 puntos porcentuales y engrosaron el grupo de los que presentan un estado bueno, que ya alcanza al 30% del área. En tanto, los cuadros en condición regular se mantienen estables respecto de la semana pasada, con unas 160.000 hectáreas.

En María Susana, los técnicos describen una situación heterogénea: “hay lotes más castigados, que ya muestran pérdida de rendimiento, y, por el contrario, lotes muy buenos, con buena tecnología aplicada, que todavía mantienen la expectativa de alcanzar muy buenos rindes”. Hacia el sur provincial, a la falta de agua se suma el efecto de las heladas. “El cultivo se encuentra dañado, con pérdida de área foliar por el efecto combinado de la sequía y las heladas”, señalan desde San Gregorio. Allí advierten que el potencial de rinde podría seguir recortándose a medida que pasen los días sin lluvias.



CONDICIÓN DEL TRIGO EN REGIÓN NÚCLEO



La situación comienza a ser más sensible porque el trigo está entrando en el período crítico de definición del rendimiento. Actualmente, cerca del 20% del área ya presenta la hoja bandera expandida y otro 1% se encuentra en espiga embuchada. Es decir, que cualquier estrés en esta etapa puede tener un impacto creciente sobre el número y peso de los granos. Todavía hay margen para sostener el potencial, pero las lluvias que puedan llegar durante las próximos días serán cada vez más importantes.

El maíz pisa el freno en el oeste por falta de humedad
Si bien en la última semana la siembra en la región avanzó 15 p.p., alcanzando el 55% del área intencionada, la falta de humedad superficial frena las labores en el oeste. El año pasado, para esta misma fecha el progreso en la región era del 60%. En Corral de Bustos y alrededores, todavía resta sembrar cerca del 60% del área, pero hay poco movimiento de sembradoras por la escasa humedad en la cama de siembra. Si bien existe margen para esperar lluvias hasta alrededor del 20 de octubre, se busca no demorar demasiado la implantación para evitar que el período crítico caiga hacia fines de diciembre o comienzos de enero. En Carlos Pellegrini, quedan algunos lotes por sembrar, pero la humedad del perfil es muy baja. Una lluvia de 10 a 15 mm permitiría completar la siembra. Hacia el este, en cambio, las mejores condiciones hídricas permiten continuar con al labores. En Bigand la siembra está prácticamente finalizada y en San Gregorio, las precipitaciones del fin de semana pasado aseguraron humedad suficiente para continuar con la implantación.

La soja se prepara para la siembra pero la calidad de la semilla genera interrogantes

Todavía falta casi un mes para que comience la siembra de soja de primera, prevista hacia el 15-20 de octubre, pero ya arrancaron los análisis de semilla para conocer su poder germinativo. En los primeros resultados están apareciendo algunos problemas: en Bigand, los primeros análisis arrojan resultados muy variables: se encontraron muestras de mala calidad junto con otras de valores excelentes. Los poderes germinativos, en semillas tratadas con fungicidas curasemillas, se ubican entre 80% y 94%. En Corral de Bustos los poderes germinativos están cercanos al 85%, cuando en años favorables suelen superar el 95%. En contraste, Carlos Pellegrini y María Susana reportan hasta el momento buenos resultados de poder germinativo, sin señales de problemas en la calidad de la semilla.

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea



FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 24 de septiembre de 2026 – N° 988 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO



GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
BCR

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 24 de septiembre de 2026 – N° 988 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

INDICADORES CLIMÁTICOS

Lo que viene, el pronóstico para la semana próxima en la región núcleo

Domingo y lunes con lluvias aisladas en la región

El periodo comprendido entre el **jueves 24 y el miércoles 30 de septiembre** comienza con buenas condiciones meteorológicas que se mantendrán hasta la **mañana del domingo 27**, cuando se espera el pasaje de un sistema frontal frío que provocará **chaparrones y tormentas aisladas**, con **mejoramientos temporarios**. Este sistema dejará de afectar la zona GEA durante la **madrugada del martes 29**. Posteriormente se esperan condiciones de **estabilidad** hasta el final del periodo de pronóstico.

Las **temperaturas máximas** ascenderán paulatinamente alcanzando los valores más altos, entre **28 y 30°C**, el **sábado 26**. Luego los registros comenzarán a descender, hasta llegar a registros entre **16 y 18°C el miércoles 30**.

Las **temperaturas mínimas** también experimentarán un **ascenso** paulatino hasta el **martes 29**, cuando se espera un descenso térmico con mínimas entre **7 y 10°C** en el sur de la zona GEA y de **10 a 12°C** en el norte, que se medirán durante el **miércoles 30 de septiembre**

Lo que pasó con el clima en la última semana en la región núcleo

Lluvias en el sudeste de GEA

La semana comprendida entre el **jueves 17 y el miércoles 23 de septiembre** se registraron precipitaciones muy **dispar** en la zona GEA. Los montos más importantes, entre los **10 y 24 mm** se midieron en el sector **sudeste**. El máximo acumulado del periodo, **24 mm**, y se registró en la localidad de **Pergamino**, en Buenos Aires.


Las **temperaturas máximas** fueron elevadas, variaron entre **27 y 29°C**, con los valores más altos en el norte y

centro de la zona GEA y los más bajos en el este. La marca máxima, **29,8°C**, se midió en la localidad de **Chovet**, en Santa Fe.

Las **temperaturas mínimas** oscilaron entre **0 y 3°C**, los valores más elevados se midieron en el centro de la zona GEA y los más bajos en el oeste y sudeste. El mínimo extremo del periodo **-0,5°C**, se midió en la localidad de **Idiazabal**, en Córdoba.

Con este panorama las reservas continuaron disminuyendo nuevamente respecto de la semana pasada. El sector con niveles de **escasez a sequía** abarca el **centro/oeste** de la zona GEA y amplió levemente su extensión, principalmente la relacionada a **sequía**. En el **sudeste** los sectores con condiciones adecuadas se mantuvieron semejantes respecto a la semana pasada.

Con las actuales condiciones, en los **próximos quince días**, se requieren entre **80 y 120 mm en el centro y oeste** de la zona GEA, mientras que en el **sudeste** los valores necesarios para llevar la humedad del suelo a valores óptimos oscilan entre los **40 y 80 mm**.



GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 24 de septiembre de 2026 – N° 988 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

Extensión GEA: O de Córdoba, N de Santa Fe, Santiago del E. y Chaco

La primavera arranca con la mirada puesta en las lluvias de octubre


Las **precipitaciones de esta última semana** replicaron la **distribución errática y dispar** de la anterior aunque, en este caso, registros con valores similares a los pasados priorizaron, dentro de la región pampeana, el territorio **bonaerense** y solo repitieron un generoso volumen sobre **Corrientes y Misiones**.

Este último aporte pluvial, recibido al final del invierno, apenas fue suficiente para que el total de lluvia acumulado durante todo el **trimestre frío**, a duras penas, alcanzara los **valores medios estadísticos** en el **centro este** de la **región pampeana**, dejando por debajo al resto.

Muy distinto fue en el caso del **centro y norte de la Mesopotamia**, donde las precipitaciones fueron mucho más prolíficas los tres meses. A punto tal, que los acumulados **superaron ampliamente los registros normales históricos**. El caso más relevante es el de la localidad de **Bernardo de Irigoyen**, en Misiones, que con un total de **680 milímetros** se ubicó muy por encima de los **400 milímetros** considerados como media invernal.

Hasta el **arranque de la primavera** las precipitaciones recibidas sobre la **zona núcleo** tuvieron un comportamiento muy **sectorizado y moderado** milimétraje. Por ese motivo las **reservas de agua** muestran un **retroceso paulatino** que, a esta altura, se hace bastante evidente y muy distinto del buen nivel con el que los perfiles llegaron al invierno. Los cultivos ya comienzan a evidenciar una **imperiosa necesidad de mayor oferta de agua**, y la previsión de los **pronósticos** no es demasiado alentadora respecto de una solución generalizada antes del final de septiembre.

Como viene sucediendo, **con las próximas lluvias el este de la zona núcleo posiblemente reciba el auxilio más inmediato**. Pero lo más probable es que una **mayor disponibilidad de agua** llegue durante **octubre**, cuando finalmente los efectos del importante **calentamiento del Pacífico Ecuatorial Central** comiencen a ejercer su **influencia potenciadora de las precipitaciones sobre el centro del país**. Algo que, por el momento, no ha ocurrido.



GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR