



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA
Guía Estratégica
para el Agro

Semana al 22 de octubre de 2026 – N° 992 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

Octubre “raro” para el trigo: a pesar de la menor radiación, el frío y las heladas, el rinde estimado es de 43 qq/ha para la región núcleo

Por Marina Barletta, Florencia Poeta y Cristián Russo


La cosecha no va a tener la espectacularidad del año pasado, pero muestra muy buenos números a pesar de todo. Con 6,7 Mt, la región cosecharían casi 60% más que el promedio de los últimos 16 años.

Lluvias intermitentes y una nueva desmejora hacia el miércoles

Los chaparrones se mantendrán hasta la madrugada del viernes, aunque podrían registrarse lluvias débiles y aisladas hasta el lunes 26. La inestabilidad retornaría el miércoles 28.

“El final de octubre abre una oportunidad para recuperar las lluvias en la franja central”, dice el consultor Elorriaga.

Falta de radiación solar en trigo: ¿por qué se puso de moda el cociente fototermal?



Está apareciendo en todas las conversaciones **pero, ¿de qué va este cociente?** Se lo suele llamar Q y relaciona la

radiación solar disponible con la temperatura media del aire. Pero la importancia que tiene es que **está asociado al potencial de rendimiento del trigo durante el período crítico**. Como la campaña pasada fue la **reina del rinde triguero** con un súper récord de 60 qq/ha, se está comparando el cociente de este año con ese ciclo. El año pasado se dio un escenario **ideal**: lluvias por sobre la media con la particularidad de que **llovía de noche** y las tasas de radiación eran excelentes. Este año, la nubosidad fue **muy marcada sobre todo en los 1ros 10 días de octubre**. Pero aparte, el mes estuvo caracterizado por **bajas temperaturas**. Se tomó para la comparación **entre el 15 de septiembre y el 11 de octubre**. En términos numéricos el resultado arroja un promedio para la región núcleo de $1,16 \text{ MJ m}^{-2} \text{ d}^{-1} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$. Pero lo importante es que respecto al 2025 esto es solo un **4% menos** (tomando el mismo periodo). Esto deja claro que el **efecto de bajas temperaturas está compensando la falta de radiación con un alargamiento de etapas sobre todo la de llenado**.

Si desglosamos entre septiembre y octubre, el detalle muestra que la última quincena de **septiembre 2026** transcurrió con **valores superiores** a los del año pasado con **6,6%**. Pero hacia fines de septiembre y comienzos de octubre los valores fueron **mas bajos**, y resultaron con una **marcada baja del -16%**.

Por otro lado, **el comportamiento tampoco fue uniforme dentro de la región**. Las **mayores bajas** se observan en las grandes zonas de **Casilda y Cañada de Gómez** en el norte de la región. Mientras que en Junín y Venado Tuerto la reducción fue menor.

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea



FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR



**BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO**

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 22 de octubre de 2026 – N° 992 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO



A pesar de la menor radiación, el frío y las heladas, el rinde estimado es de 43 qq/ha para la región núcleo

Octubre vino con sorpresas para el trigo, pero pese a todo, la 1ra estimación triguera es una **muy buena noticia para el sector**. El rinde promedio estimado para la región núcleo es de **43,6 qq/ha**, lo que lo posiciona con un **extra de 5 quintales por arriba del promedio** de los últimos 5 años (38,3 qq/ha). Con una superficie cultivada de 1,6 Mha, se alcanzaría una producción de **6,7 Mt**. ¿Qué significa este volumen? Comparado con la campaña inédita del año pasado es un **35% menos**, pero respecto al promedio histórico es casi un **60% más**. Falta mucho para la cosecha, y el trigo, como explican los técnicos, es una **carrera con obstáculos** que hay que ir sorteando para llegar a cosecha con lo que hoy se estima. **Heladas tardías, sopletes, enfermedades y problemas por excesos en cosecha** están en la lista. De hecho entre el 17 y 19 de octubre, hace apenas unos días, hubo heladas agronómicas en la región.

Una helada agronómica que enciende las alertas

Helada agronómica se le dice a temperaturas de **3°C o inferiores**. Como la medición se hace en un abrigo meteorológico y a 1,5 Mt de altura, **al nivel del suelo pueden darse temperaturas de cero grado o menos** que **comprometan los tejidos de los cultivos**. Entre la madrugada y la mañana del lunes 19 de octubre hubo temperaturas mínimas generalizadas de entre **1 y 5 °C**. Pero **en 6 de las 36** estaciones de la red GEA/BCR se registraron valores **inferiores a los 3 °C**: Idiazabal 1,2°C; Bengolea 1,3°C; Junín 2,1°C; Laboulaye 2,3°C; Canal y Monte Buey 2,5°C. El episodio fue de corta duración — **entre una y tres horas**— y con una humedad relativa **superior al 70%** lo qué afortunadamente atenuó los efectos. Se van a estar evaluando los daños durante la semana siguiente.

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



**DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS**

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea



FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 22 de octubre de 2026 – N° 992 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO



¿Qué daños puede provocar una helada en pleno período crítico del trigo?

Puede afectar la **viabilidad de las espiguillas** y la **formación de granos**, por eso obliga a seguir de cerca la evolución de los cuadros tras el evento. **Por ahora, los técnicos no observan daños generalizados.** Desde Marcos Juárez dicen: “duró muy poco y se dio con una humedad relativa superior al 90%. No deberían haber ocasionado un daño importante”, señalaron. Aunque los técnicos advierten que **los sectores bajos** podrían mostrar **daños puntuales**. “Habrá que esperar unos días para evaluar mejor. **Gratis no va a ser**”. En Junín advierten: “hay que esperar, pero **se ve efecto en los trigos**”.

¿Qué tan habitual es tener este tipo de eventos en octubre?

El análisis de los últimos 20 años indica una probabilidad **cercana al 30% en el sur de la región núcleo, frente a valores inferiores al 10% en el norte.**

El maíz bajo presión: frío, sequía y daños de helada
Crecimiento detenido, hojas amarillas y decoloración generalizada son los síntomas que se repiten en la región. En Marcos Juárez se observan daños importantes por la última helada. Si bien se espera que las plantas afectadas puedan recuperarse, el daño podría dejar una **pérdida de potencial de rendimiento** por la pérdida de heterogeneidad de desarrollo dentro de los lotes. **Por el momento, no se identificaron lotes que requieran resiembra.** En los 1ros estadios del maíz, el meristema de crecimiento se encuentra todavía **protegido** cerca de la superficie del suelo. En María Susana, la helada dejó **daños puntuales**, sin llegar a provocar mortandad de plantas. Los próximos 15 días serán determinantes para saber cuánto de este retraso puede recuperarse: “si siguen estas condiciones, **tendremos que empezar a evaluar pérdidas sobre el potencial de rendimiento**”, señalan. En Junín advierten: “**ya se nota algo de daño** por las recientes heladas en los maíces”.

“Recalculando”: arrancó la siembra de soja pero muchos decidieron postergarla por el frío

Una de las estrategias para anticiparse al “Niño” era adelantar la fecha de siembra de soja de primera. Si bien algunos comenzaron a sembrar, **las bajas temperaturas**

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 22 de octubre de 2026 – N° 992 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

obligaron a recalcular por el riesgo que significa sembrar con este frío. Muchos productores decidieron postergar la implantación. La estrategia ahora es “esperar mejores condiciones” **para evitar que la semilla permanezca demasiado tiempo en el suelo**, expuesta a factores que pueden comprometer su germinación y emergencia. En Bigand, solo arrancaron a sembrar los productores con **grandes superficies** que dependen de servicios de terceros. El grueso de las labores se concentraría a partir de la semana próxima. En Marcos Juárez, la siembra arrancó a fines de la semana pasada y avanza a buen ritmo, pese al frío. “Se está tomando como recaudo **aumentar la densidad** de siembra”, señalan los técnicos. En Junín, algunos productores ya comenzaron, **pero la mayoría esperará a que pasen las lluvias previstas** para este fin de semana.

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
BCR

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea


FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 22 de octubre de 2026 – N° 992 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO



GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 22 de octubre de 2026 – N° 992 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

INDICADORES CLIMÁTICOS

Lo que viene, el pronóstico para la semana próxima en la región núcleo

Lluvias intermitentes y una nueva desmejora hacia el miércoles

El periodo comprendido entre el **jueves 22 y el miércoles 28 de octubre** comienza con **probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas** que, con el correr de las horas, se desplazarán hacia el **este**. Si bien las condiciones meteorológicas **mejorarán durante la mañana del viernes 23**, no se descarta la ocurrencia de **algunas lluvias débiles**, tanto **aisladas como intermitentes** y un periodo de condiciones **inestables** que se mantendrá **hasta el lunes 26**. Durante el **miércoles 28** se espera que retornen las **condiciones inestables** sobre el **oeste de la zona GEA**.

Las **temperaturas máximas** descenderán hacia el fin de semana aunque, **a partir del lunes 26**, comenzarán a **ascender** nuevamente alcanzando los máximos valores, entre **24 y 27°C**, el **miércoles 28**.

Las **temperaturas mínimas** descenderán a partir del **sábado 24** llegando a los valores más bajos, entre **8 y 11°C**, el **lunes 26**, posteriormente los registros volverán a **ascender** paulatinamente.

Lo que pasó con el clima en la última semana en la región núcleo

Lluvias dispares en la región

La semana comprendida entre el **jueves 15 y el miércoles 21 de octubre** se registraron **precipitaciones dispares** en la zona GEA. Los montos más importantes, entre **8 y 12 mm**, se midieron en el **oeste**, mientras que en el resto de la región los acumulados oscilaron entre **1 y 5 mm**. El registro máximo, **11,6 mm**, se midió en la localidad de **Bengolea**, en Córdoba.

Las **temperaturas máximas** variaron entre **22 y 25°C**, con los valores más altos en el centro de la zona GEA y los más bajos en el noroeste y sur. La marca máxima, **25,6°C**, se midió en la localidad de **Guatimozin**, en Córdoba.

Las **temperaturas mínimas** oscilaron entre **2 y 5°C**, con los valores más elevados en el norte de la zona GEA y los más bajos, entre **1 y 3°C**, en la porción oeste. El mínimo extremo del periodo **1,2°C**, se registró en la localidad de **Idiazabal**, en Córdoba.

Con este panorama el área de **sequía** persiste en el **sector noroeste**, mientras que la superficie con condiciones de **escasez permanece extensa**. En el **este** de la zona GEA las reservas varían de **regulares a adecuadas**, principalmente en el **sudeste**.

Con las actuales condiciones, en los **próximos quince días**, se requieren entre **80 y 140 mm** en el **centro** y, principalmente, **oeste** de la zona GEA. En el **sudeste** los valores necesarios para llevar la humedad del suelo a valores óptimos oscilan entre **20 y 80 mm**.

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea


FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 22 de octubre de 2026 – N° 992 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO



En el medio, la **región pampeana**. Donde, con excepción del **centro oeste de La Pampa**, apenas se recibieron **lloviznas débiles y muy dispares, por debajo de los cinco milímetros**, insuficientes para compensar el creciente requerimiento de los cultivos implantados, que siguen **mermando las reservas acopiadas durante el invierno**.

Con la influencia de un importante **evento Niño** que está afectando significativamente el **noreste del país**, y parte del **extremo oeste**, se vuelve llamativo un escenario como el que se ha instalado sobre la **franja central**, haciendo que **gran parte de la zona núcleo** se mantenga al borde de la **sequía**, incluso con **precipitaciones por debajo de la media en algunos sectores**.

Extensión GEA: O de Córdoba, N de Santa Fe, Santiago del E. y Chaco

El final de octubre abre una oportunidad para recuperar las lluvias en la franja central

A diferencia de lo ocurrido en el **extremo noreste de nuestro litoral**, las precipitaciones han mantenido una muy **baja actividad** sobre las provincias que componen la **región pampeana**.

En los últimos siete días las lluvias más importantes presentaron una distribución contrapuesta. Por un lado sobre el **extremo noreste** del país, donde la recurrencia pluvial ya lleva varias semanas, llevando los acumulados a **valores superiores a los normales históricos**. Por el otro, contrariamente a lo habitual, sobre provincias ubicadas en el **extremo oeste**, como **Neuquén y Mendoza**, donde los registros están **triplicando y hasta cuadruplicando** las **marcas medias estadísticas de todo octubre**.

Aunque parece una conducta por lo menos curiosa de las lluvias, cuando tomamos en cuenta el conjunto de todos los **factores que condicionan el comportamiento climático y pluvial de Argentina** es más evidente entender el porqué.

La conjunción de un **centro de alta presión** sobre el **Atlántico sur** y otro de **baja presión** a la altura de las **costas de Buenos Aires** condiciona el avance de los **sistemas frontales** y sostiene la **circulación desde el Atlántico, más frío que lo normal**, hacia el **centro del país**. Estas condiciones alteran la circulación habitual provocando un virtual **bloqueo atmosférico**. El resultado es el que viene mostrando la **franja central del país**, preponderancia de días con **elevada nubosidad, menor radiación solar diaria, temperaturas por debajo de lo normal y precipitaciones débiles, puntuales e intermitentes**, muy alejadas de los valores recibidos sobre el norte de la Mesopotamia.

El **comportamiento atmosférico** actual es un **fenómeno de circulación de escala regional**, que **no responde directamente a la influencia del Niño** y, por lo tanto, que

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR




BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 22 de octubre de 2026 – N° 992 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

se produzca un cambio en la respuesta pluvial dependerá del **debilitamiento** de los **patrones que están alterando el desplazamiento habitual de las masas de aire**. Algo que, según los **pronósticos de muy corto plazo**, podría ocurrir, al menos parcialmente, en el **comienzo de la última década del mes**.



GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR