BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO

GEA
Guía Estratégica para el Agro

Semana al 05 de noviembre de 2026 – N° 994 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

Lluvias de más de 100 mm en el SE cordobés y 16.000 hectáreas con posibles daños de granizo en la región

Por Marina Barletta, Florencia Poeta y Cristián Russo


El trigo entusiasma, pero las heladas, el fusarium y el granizo dejarán sus marcas en los rindes. En soja, las lluvias de esta semana generan preocupación por el efecto de "planchazo" sobre la última tanda de siembra.

Luvias entre viernes y sábado y temperaturas en ascenso a partir del domingo

En la mañana del viernes 6 aumenta la probabilidad de precipitaciones por el **pasaje de un sistema frontal frio**. El tiempo mejoraría en la mañana del sábado 7.

"Los modelos de pronóstico marcan el avance de otro sistema frontal, en este caso desde el sur de la región pampeana, con buena cobertura de precipitaciones", dice el consultor **Elorriaga.**

Noviembre empezó con más lluvias y un fuerte carácter de violencia en las tormentas



En los últimos 7 días, las lluvias se volvieron más frecuentes pero tambien **mucho más violentas.** Hay localidades con acumulados menores a los 20 mm como en Hernándo, pero los acumulados trepan sobre los 70 mm en María Teresa (103 mm), Godeken (82 mm) o María Teresa (80 mm). La más complicada fue la tormenta del martes (3/11). Aparte de fuertes acumulados de lluvia, hubo **ráfagas de viento muy intensas y caída de granizo**. Los técnicos del SE cordobés indican precipitaciones superiores a los 100 mm: "las tormentas dejaron lluvias de entre **70 y 130 mm**. **Se concentraron en sectores puntuales y en muy poco tiempo y fue con granizo".** El área fue la más golpeada: "**hay trigos revolcados por el viento, maíces barridos por completo y lotes de soja recién emergidos que deberán evaluarsen para ser resembrados**", advierten desde **Monte Buey y Corral de Bustos. El granizo tambien afectó a Justiniano Posse, Sacanta, Oncativo, Río Tercero y Embalse** en Córdoba. En Santa Fe, los daños se reportan **desde Armstrong, Bustinza, Timbúes, Pueblo Andino, Lucio V. López y Salto Grande.**

¿Cuánta fue el área afectada por granizo?



GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas
Galicia
la segunda
Grupo San Cristóbal
Sancor Seguros
Cooperación
DAN

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
BCR

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea


Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.
FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR

Para responder la pregunta se reconstruyo el recorrido de la tormenta y se analizaron imágenes de radar meteorológico de libre acceso. Como referencia se utilizó el indicador COLMAX, que registra la máxima intensidad de la señal que devuelve el radar en la columna atmosférica. Las **señales de entre 55 y 60 dBZ (rosa y rojo)** estan asociadas a tormentas con potencial de **granizo**, **mientras que las superiores a 60 dBZ (rojo) corresponden a núcleos de mayor intensidad.** El **relevamiento preliminar identificó 15.600 hectáreas** alcanzadas por ecos de reflectividad iguales o superiores a **55 dBZ,** de las cuales **2.300 hectáreas** registraron valores de **60 dBZ o más. Estos valores representan una estimación de la superficie potencialmente expuesta al fenómeno pero no constituyen una medición directa del daño sobre los cultivos**. El análisis continuará en los próximos días con la incorporación de reportes de colaboradores y de imágenes satelitales posteriores a la tormenta, que permitirán avanzar en la identificación y evaluación de las áreas efectivamente afectadas.

El trigo entusiasma, pero las heladas, el fusarium y el granizo dejarán sus marcas en los rindes

El trigo venía asomando una muy buena campaña, con rindes potenciales que en varias localidades se ubican entre los **40 y 50 qq/ha y picos de hasta 60 qq/ha** como reportan desde Pergamino. Pero la película tiene todavía final abierto y varias preguntas por delante.

La 1ra tiene que ver con las heladas, parecía que no iban a ser de consideración, pero en los relevamientos se empiezan a **hacer visibles los daños**. En Venado Tuerto describen una afectación muy variable: "tenés algunas con daño en la espiga completa y otras con la mitad afectada". Tambien, Fusarium se suma para agregarle incertidumbre a este final de ciclo triguero. En Los Quirquinchos, por ejemplo ya detectan la presencia de la enfermedad y **temen que las lluvias favorezcan su avance**. En Junín, **preocupa lo que podría aparecer**: "seguramente vamos a empezar a ver espigas blancas. **Todavía no se manifiesta, pero con estas condiciones es preocupante**", dicen. En María Susana, en cambio por ahora, la situación es m**ás alentadora**: "hay **muy poca fusariosis**", señalan, aunque advierten de otro peligro, las lluvias: "podrían empezar a lavar los granos y hacerles perder peso".



La siembra de soja avanza entre las ventanas que dejan las lluvias

En la última semana se logró avanzar con la siembra de **500.000 ha** de soja de primera en la región núcleo. De esta manera, el progreso alcanza el **30% del área prevista,** ubicándose 4 p.p. **por encima** del promedio de las últimas cinco campañas para esta fecha. **El avance muestra fuertes diferencias entre zonas.** El norte de Buenos Aires lidera las labores con el **50%** del área implantada. Le siguen el centro-sur de Santa Fe, con el 27%, el sur de Santa Fe, con el 22%, y el sudeste de Córdoba, con el 20%. **Las lluvias van abriendo y cerrando ventanas de siembra, con un ritmo muy dispar entre localidades.**

Por otro lado, **queda la incertidumbre sobre qué sucederá con los últimos lotes sembrados antes de las tormentas**. En Venado Tuerto, "hubo gente que estuvo sembrando el lunes y **luego le llovieron 60 milímetros**

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas: Galicia, la segunda, Grupo San Cristóbal, Grupo Sancor Seguros, Cooperación, DAN


DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
BCR

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR


arriba y ahora sale el sol fuerte. No sabemos cómo les va a ir con esa siembra", advierten los técnicos por el temido efecto de "planchazo", una costra superficial que impide la emergencia y obliga a tener que resembrar.



GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas Galicia la segunda Grupo San Cristóbal Grupo Sancor Seguros Cooperación DAN

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.
FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR

SUBZONAS Y RED DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS GEA



SUBZONA I

En **Carlos Pellegrini**, el trigo mantiene buenas perspectivas con rindes estimados en torno a los **40 qq/ha** y máximos de 45 qq/ha. "En un año normal, los rindes promedio de la zona rondan los 30 qq/ha", explican los técnicos. La siembra de soja de primera avanza a medida que las lluvias van dando tiempo. Hasta el momento se implantó el **35%** del área. Por su parte, el maíz muestra una **muy buena recuperación** luego de las heladas y las bajas temperaturas. "Los lotes retomaron el crecimiento y actualmente presentan muy buenas condiciones de desarrollo", dicen en el área.

"En trigo estamos contando **500 espigas por metro cuadrado, tamaño intermedio, bien granada**", resumen los técnicos de **María Susana**. "**Hay muy poca fusariosis**", agregan. Respecto a que tan vulnerable puede ser el trigo ante mayores lluvias, dicen: "**las próximas lluvias de ahora en más pueden empezar a lavar los granos y hacerles perder un poco de peso**. Pero para que ocurra esto deberían ser continúas y abundantes. Por ahora estamos lejos de eso. Son intensas, pero de bajo milimetraje. Mañana (3/11) veremos que ocurre". Por el momento dejan claro que el trigo lograría un nivel de productividad "**de aceptable a bueno**. En nuestra zona esperamos en **40 a 50 qq/ha o algo más**". Los técnicos también atienden campos en **Santiago del Estero** y cuentan que está pasando con la cosecha: "hay productores que vienen atrasados con la cosecha pero siguen con buenos rindes entre **30 a 40 qq/ha**. Hablamos de lotes **sin fertilizar**", destacan. Los maíces están en recuperación, pero **hay problemas**: "estamos notando que se están dando **diferencias por competencia interespecifica** (o sea encíasencias entre las mismas plantas del cultivo sembrado). Lo decimos porque notamos cómo las plantas que fueron menos afectadas están siendo más efecientes para tomar recursos y **se ve una difencia muy marcada entre tamaño**. Se nota en **sectores o plantas que fueron sensiblemente golpeadas por el frío** y la falta de horas calor. Aparte, hay un porcentaje de **plantas muertas**". En soja, se avanza con la siembra, ya está implantado el **5%** del área. "Veremos después que tan bien nos va con los **nacimientos** en estas condiciones", dicen.

SUBZONA II

En **Bigand**, el trigo presenta una importante variabilidad en los recuentos de espigas, que oscilan entre **320 y 390 espigas/m^2.** Por el momento, **no** se observa presencia de fusariosis y el rinde promedio esperado se mantiene en torno a los **40 qq/ha** (en un año normal, el promedio de la zona ronda los 37 qq/ha). Aunque, "la alternancia de lluvias, baja luminosidad y temperaturas más elevadas cuando aparece el sol **podría afectar la producción y la cosecha**. A esto se suman los daños provocados por las **heladas** en algunos lotes, donde se observan **espigas y espiguillas afectadas y una reducción del número de macollos.** Se espera, por lo tanto, una **gran amplitud** entre los rindes mínimos y máximos de la región", señalan

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas: Galicia, la segunda, Grupo San Cristóbal, Sancor Seguros, Cooperación, DAN

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR

los técnicos. Respecto a la siembra de soja de primera, avanza entre el **25 y el 40%** del área según la zona. Las labores se desarrollan **sin inconvenientes** hasta el momento ni en la implantación ni en la emergencia de los lotes pese a las últimas tormentas. En maíz, los lotes muestran una **recuperación** luego de las heladas y las bajas temperaturas. Las últimas lluvias favorecieron la evolución de los cultivos y se espera que continúen mejorando. Además, durante los últimos días se avanzó con las **aplicaciones de nitrógeno**, aprovechando la llegada de las precipitaciones.

En **Bombal**, los técnicos estiman un rinde promedio de trigo de **40 qq/ha** y máximos que podrían alcanzar los 44 qq/ha. Estos valores se ubican en línea con los registros habituales de la zona, donde el promedio ronda los 40 qq/ha y los máximos, los 42 qq/ha. Por el momento, **no** se reportan casos de fusariosis en la zona. La siembra de soja de 1ra recién comienza, con un avance del **5%** del área.

En **Venado Tuerto**, las lluvias dejaron alrededor de **80 mm** acumulados entre el fin de semana y el lunes. El **granizo afectó algunos sectores** pero no provocó daños de consideración. Los maíces muestran una **buena recuperación** tras sufrir las últimas heladas: "hubo lotes a los que les había pegado bastante, pero se recuperaron muy bien y vienen bien en general", señalaron. En trigo, en cambio, comienza a observarse **daño por heladas** con afectación en las espigas: "**tenés algunas con daño en la espiga completa y otras con la mitad afectada**". En cuanto a la soja de primera, ya hay lotes sembrados antes de las últimas lluvias, aunque preocupa cómo responderán las implantaciones realizadas con **abundante humedad** en el suelo y posterior exposición a temperaturas elevadas. "Todavía resta una superficie importante por sembrar, pero esperamos que para la próxima semana se pueda completar gran parte de las labores".

En la zona de **Los Quirquinchos** se acumularon alrededor de **80 mm sin inconvenientes por granizo**. Los mayores problemas siguen asociados a las **heladas** que afectaron algunos lotes de **maíz**. "Hay lotes que van a quedar medio **desparejos**; habrá que ver después cómo influye eso en el rinde", señalan. En trigo, los cultivos mantienen una **buena condición** y, por el momento, **no se observan daños** importantes por frío. Sin embargo, **comienza a detectarse presencia de Fusarium** en los lotes, una situación que genera preocupación ante la **continuidad** de las lluvias y por su posible avance sobre el cultivo.

SUBZONA III

En **Pergamino**, "los recuentos de espigas de trigo se encuentran **dentro de los valores medios, aunque entre 100 y 200 espigas/m² por debajo de los registrados el año pasado"**, dicen los técnicos. **No se observa fusariosis** de la espiga ni daños severos por heladas. Sin embargo, las lluvias representan una **amenaza** para la sanidad del cultivo y podrían complicar la cosecha. Para esta campaña se estima un rinde promedio de **50 qq/ha**, con máximos de 60 qq/ha, valores en línea con los habituales de la zona. La siembra de soja de 1ra avanzó a buen ritmo, aunque las últimas lluvias obligaron a interrumpir las labores. El progreso presenta diferencias entre localidades: alcanza el **70%** en Colón y el **40%** en Pergamino. En cuanto al maíz, los cultivos presentan una **buena evolución**, aunque con una **biomasa algo limitada por las bajas temperaturas**. Las lluvias y el aumento de las temperaturas están favoreciendo la **recuperación**. Se advierte la emergencia de **yuyo colorado** en algunos lotes.

SUBZONA IV

En **Junín**, el trigo muestra **algunos daños** por las últimas heladas. Hay diferencias **según cultivares** y una mayor afectación en las **espigas de macollos**, aunque también se observan casos en **espigas principales**. Sin embargo, la mayor preocupación pasa por la posible aparición de

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas: Galicia, la segunda, Grupo San Cristóbal, Sancor Seguros, Cooperación, DAN

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.
FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR

fusariosis. "Con las condiciones que se dieron, **seguramente vamos a empezar a ver espigas blancas. Todavía no se manifiesta**, pero eso sí puede ser bastante **preocupante**", advierten los técnicos. En maíz también se encontraron **daños foliares puntuales** por heladas, incluso **algunas plantas completamente blancas**, aunque sin consecuencias de gravedad. Por su parte, la siembra de soja, que tomó impulso hace unos 10 a 15 días, está ingresando en su **tramo final.** También se implantaron algunos lotes de girasol. En cuanto a las condiciones hídricas, la zona venía con reservas ajustadas, especialmente hacia el norte, pero las últimas precipitaciones trajeron **alivio**. Entre el domingo por la noche y la jornada de hoy se registraron lluvias de **20 a 25 mm** bastante generalizadas en toda la zona. "Nos vino bien esta lluvia; algunos van a poder **sembrar tranquilos** ahora", señalan. Si bien los nuevos chaparrones pueden demorar algunas labores, permiten recuperar humedad superficial y avanzar **con mayor seguridad** en las siembras pendientes.

SUBZONA V

En la zona de **Corral de Bustos y Monte Buey**, las tormentas dejaron lluvias de entre **70 y 130 mm**. "**Se concentraron en sectores puntuales y en muy poco tiempo, acompañadas por una intensa caída de granizo**". Ya se reportan **daños importantes en trigo, maíz y lotes de soja de reciente implantación**. En algunos sectores de **Monte Buey** y **Justiniano Posse** incluso se observan **imágenes que anticipan pérdidas severas con casos de afectación total**. El impacto preocupa especialmente en trigo, que hasta el evento presentaba **muy buenas condiciones** y expectativas de rindes cercanas a los **50 qq/ha**, y en maíz, que se encontraba bien implantado y entre V3 y V6 (tercera y sexta hoja). La soja estaba en plena etapa de siembra y emergencia. "Fue una tormenta **muy intensa**, en muy poco tiempo. **Ahora habrá que esperar unos días para dimensionar realmente los daños**", advierten los técnicos.

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas Galicia la segunda Grupo San Cristóbal Grupo Sancor Seguros Cooperación DAN

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
BCR

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.
FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR

BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO

GEA
Guía Estratégica para el Agro

Semana al 05 de noviembre de 2026 – N° 994 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

INDICADORES CLIMÁTICOS

Lo que viene, el pronóstico para la semana próxima en la región núcleo

Lluvias entre viernes y sábado y temperaturas en ascenso a partir del domingo

El periodo comprendido **entre el jueves 5 y el miércoles 11 de noviembre** comienza con **buenas condiciones meteorológicas** hasta la mañana del **viernes 6. En ese momento aumenta la probabilidad de precipitaciones** en la zona GEA debido al pasaje de un sistema frontal frio. Se espera que las **condiciones del tiempo mejoren durante la mañana del sábado 7,** acompañadas por la rotación al sector sur y la intensificación de la velocidad del viento en forma temporal. **La estabilidad se mantendrá hasta la tarde del martes 10**, cuando se espera un **desmejoramiento en el oeste de la zona GEA**, con la **probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas** y mejoramientos temporarios que se extenderán a toda la región hacia el final del periodo de pronóstico.

Las **temperaturas máximas** descenderán durante el sábado 7 pero, a **partir del domingo 8, los valores comenzarán a ascender paulatinamente**, alcanzando los **28 a 31°C el martes 10**.

Las **temperaturas mínimas** descenderán durante la noche del viernes 6, alcanzando los valores más bajos, entre 6 y 9°C. El domingo 8, **los registros mínimos irán ascendiendo con el correr de los días.**

Lo que pasó con el clima en la última semana en la región núcleo

Lluvias generalizadas con más de 100 mm en el sudeste cordobés

La semana comprendida **entre el jueves 29 de octubre y el miércoles 4 de noviembre** se registraron **precipitaciones** en la zona GEA. Los montos más importantes, mayores a **50 mm, se midieron en la porción central,** orientada de oeste a este. **En el resto de la región los acumulados oscilaron entre 10 y 50 mm**. El registro **máximo, 103 mm,** se midió en **la localidad de Laboulaye, en Córdoba**.

Las **temperaturas máximas** variaron entre **27 y 34°C**, con los **valores más altos en el centro de la zona GEA y los más bajos en el sudeste.** La **marca máxima, 33,6°C**, se midió en la localidad de Guatimozín, en Córdoba.

Las **temperaturas mínimas** oscilaron **entre 8 y 14°C**, con los valores más elevados en el noreste de la zona GEA y los más bajos en el sudeste. **El mínimo extremo del periodo 8,2°C,** se midió en la localidad de **Junín, en Buenos Aires.**

Con este panorama **el área de sequía y escasez disminuyó respecto a la semana pasada**, localizándose en el sector noroeste de la zona GEA. **La humedad de suelo aumenta hacia el este, pasando de regular a óptima**, **principalmente en el sector sudeste.**

Con las actuales condiciones, en los próximos quince días, se requieren entre **100 y 140 mm en el noroeste** de la zona GEA. En el **centro/este** los valores necesarios para llevar la humedad del suelo a valores óptimos **van desde los 10 a los 80 mm.**

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas: Galicia, la segunda, Grupo San Cristóbal, Sancor Seguros, Cooperación, DAN

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
BCR


Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.
FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR

BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO

GEA
Guía Estratégica para el Agro

Semana al 05 de noviembre de 2026 – N° 994 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO



Extensión GEA: O de Córdoba, N de Santa Fe, Santiago del E. y Chaco

Lluvias y tormentas en el sur de Córdoba y Santa Fe

La **transición de octubre a noviembre** llegó con un significativo cambio en el comportamiento pluvial que comenzó a equiparar los aportes de agua entre el este y el oeste de la zona núcleo.

En los últimos siete días desarrollos en forma de **tormentas y chaparrones intensos** cubrieron gran parte del **sudeste cordobés y del extremo sur de Santa Fe** regiones que, hasta el momento, solo habían recibido lluvias aisladas de montos alejados de los necesarios para recomponer la escasa humedad presente en los perfiles.

Si bien las descargas pluviales mantuvieron cierta **heterogeneidad,** en esta oportunidad llegaron con **mayor volumen a sectores de la franja central** sistemáticamente eludidos por las precipitaciones de octubre. El **aporte de agua fue muy bueno para el oeste cordobés pero parcialmente empañado por importante caída de granizo en varios sectores**.

A diferencia de lo que ocurre normalmente el **sistema frontal** no avanzó desde el sudoeste pampeano sino desde el **centro oeste hacia el este, recorriendo horizontalmente la zona núcleo.** El aire más frio, de origen serrano se combinó con una atmósfera mucho más cálida y húmeda, provocando el rápido desarrollo de **granizo con mayor intensidad sobre localidades del sudeste de Córdoba y con menor rigurosidad y cobertura en algunos sectores del sur santafecino.**

Debido al desplazamiento horizontal en el que avanzaron las precipitaciones **los buenos aportes de agua no se extendieron hacia el centro norte del país**: norte de **Córdoba, Santiago del Estero, norte de Santa Fe y oeste de Chaco**, zonas donde las reservas de agua continúan siendo **deficitarias con sectores de sequía**.


Con el buen desempeño de estas últimas precipitaciones, la humedad disponible en el corazón de la zona núcleo minimizó la disparidad entre las reservas del este y el oeste. **El arranque de noviembre parece indicar que finalmente el mayor contenido de humedad en la atmósfera,** derivado del **efecto potenciador del evento Niño,** comienza a capitalizarse en mayores lluvias sobre la región pampeana. **Una tendencia que podría afianzarse**, si se concreta la previsión de los modelos de pronóstico que marcan el **avance de otro sistema frontal, en este caso desde el sur de la región pampeana**, que nuevamente **promoverá precipitaciones con buena cobertura en el inicio del próximo fin de semana.**

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas: Galicia, la segunda, Grupo San Cristóbal, Sancor Seguros, Cooperación, DAN

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
BCR

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.
FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR



GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas

Galicia · la segunda · Grupo San Cristóbal · Grupo Sancor Seguros · Cooperación · DAN

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
BCR

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR